

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| トルプロカルブ粒剤 ゴウケツパック | 取扱メーカー： 北興 |
| | 原体メーカー： 三井アグロ |
| 成分： トルプロカルブ〔MBI-P〕20.0% | 性状： 褐色細粒，水溶性パック入り 1パック45g |
| | 毒性： 普通物 消防法： — |

【品目特性】

- ゴウケツ粒剤の項参照。
- 拡散スピードが速いパック剤で，稲が成長していても拡散不良が起きにくい。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 湛水深を3cm以上にし，小包装（パック）のまま10a 当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。
- 水田に投げ入れた後は少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち，散布後7日間は落水及びかけ流しをしない。
- 藻や浮草が多発している水田では，拡散が不十分となり効果が劣る場合があるので使用しない。
- 小包装（パック）に使用しているフィルムは水溶性のため，濡れた手で作業したり，降雨等で破袋しないように注意する。
- ゴウケツ粒剤の項を参照。

【適用と使用法】

| 作物名 | 適用病害名 | 10 a 当り 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | トルプロカルブを含む 農業の総使用回数 |
|-----|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|--|
| 稲 | いもち病 もみ枯細菌病 | 小包装 (パック) 10個 (450 g) | 出穂5日前まで 但し， 収穫30日前まで | 1回 | 水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れる。 | 2回以内 (移植時までの処理 は1回以内，本田で の湛水散布，無人航 空機散布，投げ入れ は合計1回以内) |