

# スミロディー乳剤

成分：フェンプロパトリン〔PRTR・1種〕……5.0%

MEP〔PRTR・1種〕……45.0%

その他 PRTR 該当成分：キシレン〔PRTR・1種〕……20%以下

エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……20%以下

毒性：劇物

## 【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用流量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フェンプロパトリンを 含む農薬の総使用回数	MEPを含む農 薬の総使用回数				
み か ん	コアオハナムグリ ケシキスイ類 チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類	1000～ 2000倍	200～ 700 ℓ	14 日前まで	4 回以内	散布	9 回以内 (噴射は5回 以内、散布 及びくん煙 は合計4回 以内)	5 回以内 (樹幹処理は 1回以内)				
	ミカンハモグリガ	2000倍										
	ミカンハダニ ミカンキイロアザミウマ	1000倍			3 回以内			3 回以内 (樹幹処理は 1回以内)				
	コアオハナムグリ ケシキスイ類 チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類	1000～ 2000倍										
かんきつ (みかんを 除く)	ミカンハモグリガ	2000倍		3 日前まで	5 回以内		10 回以内 (噴射は5回 以内、散布 は5回以内)	6 回以内 (樹幹処理は 1回以内)				
	ミカンハダニ ミカンキイロアザミウマ	1000倍										
	アブラムシ類 モモハモグリガ	1000～ 2000倍							3 日前まで	5 回以内	10 回以内 (噴射は5回 以内、散布 は5回以内)	6 回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	シンクイムシ類	1000倍										
も も	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	4 回以内	5 回以内	5 回以内					
きゅうり	アブラムシ類 ハダニ類	1000倍		3 日前まで		4 回以内	6 回以内					
メ ロ ン	コナジラミ類			14 日前まで	3 回以内	3 回以内						
す い か	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 2000倍		前日まで	5 回以内	5 回以内	5 回以内					
かぼちゃ	コナジラミ類					2000倍	2 回以内	3 回以内	2 回以内			
な す	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 2000倍		200～ 400 ℓ	摘採 21 日 前 まで	1 回	1 回	1 回				
ト マ ト	コナジラミ類	2000倍										
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ チャハマキ	1000～ 2000倍	1000 ℓ						—	6 回以内	6 回以内	6 回以内
	クワシロカイガラムシ	1000倍										
	き く	ハダニ類	100～ 300 ℓ	—	6 回以内	6 回以内	6 回以内					

〔取扱メーカー〕 サンケイ\*, 住友化学