

クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤	取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ*，北興*， 住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………16.0%	性状： 青緑色水溶性細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- カメムシ目，ハエ目，コウチュウ目，チョウ目，アザミウマ目，バッタ目の幅広い害虫に対して高い防除効果を発揮する。
- 有機リン・カーバメート・合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を発揮する。
- 浸透移行性も優れているので葉裏や新しく展開してくる葉に発生するアブラムシ類などに対しても優れた効果を示す。
- 優れた防除効果が長期間持続する。
- 水に溶けやすい顆粒状の製剤なので薬液調製時に粉立ちが少なく，作物への汚れも少ない。
- 空ボトルは簡単につぶせる。
- 天敵のケナガカブリダニ，クモ類に対する影響が少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 稲（箱育苗）に使用する場合は，育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に散布する。また，軟

弱徒長苗，ムレ苗，移植適期を過ぎた苗などには，薬害を生じるおそれがあるので注意する。

- ぶどうに使用する場合，袋かけ前までの幼果期に散布すると品種によっては果粉が溶脱するおそれがあるので注意する。
- かんぎつに樹幹散布で使用する場合は，散布液が葉にかからないように十分注意する（薬害）。
- 共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- マルハナバチに影響があるので注意する。
- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 眼に対して刺激性があるので，眼に入らないように注意する。
- 共通注意事項6，街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イネドロオイムシ イネアザミウマ	4000 倍	60 ～ 150 ℓ	7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (直播では 種時又は移植 時までの処理 は 1 回以内、 本田での散 布、空中散布、 無人航空機散 布は合計 3 回 以内)
	ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ	1000 倍	25 ℓ				
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	200 倍	育苗箱 (30×60 × 3cm, 使用土壌 約 5 ℓ) 1 箱当り 500 ml	移植 3 日 前～移植 当日	1 回	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	4 回以内 (移植時ま での処理は 1 回 以内、本田で の散布、空中 散布、無人航 空機散布は合 計 3 回以内)
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	200 ～ 400 倍					
りんご	カメムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000 ～ 4000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし	シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 チュウゴクナシギジラミ						
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類						
	コガネムシ類	2000 倍					
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類	2000 ～ 4000 倍		3 日前 まで			
	コガネムシ類						
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000 倍			2 回以内		2 回以内
うめ	ケシキスイ類	2000 ～ 4000 倍		前日まで	3 回以内		3 回以内
	アブラムシ類 ケムシ類 カメムシ類						
すもも	カメムシ類 アブラムシ類				3 日前 まで		

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数			
あ ん ず	アブラムシ類	4000 倍	200～ 700 ℓ	3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内			
ぶ ど う	コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ブドウトラカミキリ カメムシ類 コガネムシ類									
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類 アオバハゴロモ	2000～ 4000 倍		前日まで			3 回以内	散布	6 回以内 (樹幹散布は 3 回以内、散 布は 3 回以 内)	
	カネタタキ	2000 倍								
	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ	20 倍								150 日前 まで
	ミカンキジラミ	40 倍								
	かんきつ (苗木)	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ アゲハ類 アブラムシ類		20 倍						10～ 100 ml / 樹
か き	カキノヒメヨコバイ アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	2000～ 4000 倍		7 日前 まで				2 回以内	散布	
	いちじく	アザミウマ類 カミキリムシ類		2000 倍						3 日前 まで
び わ	アブラムシ類 カメムシ類 カイガラムシ類	2000～ 4000 倍		前日まで						7 日前 まで
	カミキリムシ類	2000 倍								
な つ め	ゴマダラカミキリ	4000 倍	前日まで	120 日前 まで						
さんしょう (果実)	アザミウマ類									
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカシノメイガ カメムシ類	2000～ 4000 倍 2000 倍	前日まで	120 日前 まで						
	オリーブ (葉)	オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカシノメイガ			4000 倍					

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数	
マンゴー	アザミウマ類 コナカイガラムシ類	2000 ～ 4000 倍	200 ～ 700 ℓ	7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
パパイア	ナガカタカイガラムシ ヒラタカタカイガラムシ	2000 倍		3 日前 まで				
ブルーベリー	アブラムシ類 ケムシ類 オウトウショウジョウバエ	2000 ～ 4000 倍		45 日前 まで				
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ カメムシ類 アオバハゴロモ			前日まで				
パイナップル (苗木)	パイナップルコナカイガラムシ	2000 倍	－	植付前	1 回	10 秒間 苗浸漬	1 回	
未熟とうもろこし	アブラムシ類 アカスジカスミカメ	2000 ～ 4000 倍	100 ～ 300 ℓ	3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類			前日まで			4 回以内 (育苗期の株 元処理及び定 植時の土壌混 和は合計 1 回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 3 回以内)	
	メ ロ ン	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ ウリハムシ ハモグリバエ類						2000 ～ 4000 倍
す い か		アブラムシ類 ウリハムシ						
	にがうり	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ						2000 ～ 4000 倍
かぼちゃ	アブラムシ類 ウリハムシ	2000 倍		4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後の 散布は 3 回 以内)				
	とうがん						ミナミキイロアザミウマ	2000 倍
食用へちま	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍		前日まで			4 回以内 (育苗期の株 元処理及び定 植時の土壌混 和は合計 1 回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 3 回以内)	
な す	ミナミキイロアザミウマ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 テントウムシダマシ類 カメムシ類							

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数
ト マ ト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～ 4000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗期の株 元処理及び定 植時の土壌混 和は合計 1 回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 3 回以内)
	ハモグリバエ類	2000 倍			2 回以内		3 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 2 回以内)
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類	2000～ 4000 倍			3 回以内		3 回以内
	ミナミキイロアザミウマ	2000 倍		3 日前 まで	2 回以内		3 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 2 回 以内)
とうがらし類	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～ 4000 倍			3 回以内		4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)
	ミナミキイロアザミウマ	2000 倍			2 回以内		3 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、は種後 は 2 回以内)
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類	2000～ 4000 倍			3 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、は種後 は 2 回以内)
	アオムシ コナガ	2000 倍			3 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
はくさい	アブラムシ類	2000～ 4000 倍			2 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
	アオムシ コナガ	2000 倍			2 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
ブロッコリー	アブラムシ類	2000～ 4000 倍		前日まで	2 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、は種後 は 2 回以内)
	アオムシ コナガ				2 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
はなっこりー	アブラムシ類	2000 倍		7 日前 まで	2 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
だいこん	ダイコンハムシ			3 日前 まで	3 回以内		4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
		2000～ 4000 倍					
か ぶ	アブラムシ類						

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数
非結球あぶら な科葉菜類 (こまつな, チンゲンサイ, なばな類を 除く)	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍	100 ～ 300 ℓ	7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
こまつな				3 日前 まで			4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内, 散布は 3 回以内)
チンゲンサイ		7 日前 まで		4 回以内 (は種時及び 定植時の土壌 混和は合計 1 回以内, 散布 は 3 回以内)			
しゅんぎく	アブラムシ類 ハモグリバエ類			2000 ～ 4000 倍	4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内, 散布は 3 回以内)		
	レタス	アブラムシ類			3 日前 まで		2 回以内
アザミウマ類 ナモグリバエ		2000 倍					
非結球レタス	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍		4 回以内			
	ナモグリバエ	2000 倍			4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内)		
ねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000 ～ 4000 倍			前日まで		3 回以内
わけぎ あさつき				4 回以内			
にら	アブラムシ類	4000 倍		7 日前 まで			
にら (花茎)	ネギアザミウマ						
ばれいしょ	アブラムシ類	1000 倍			25 ℓ		7 日前 まで
	テントウムシダマシ類						
かんしょ	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍	100 ～ 300 ℓ				3 回以内 (植付前の処 理は 1 回以 内, 植付後は 2 回以内)

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数	
やまのいも	アブラムシ類	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ	7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (植付時までの 処理は1回 以内、植付後 は3回以内)	
てんさい	テンサイトビハムシ カメノコハムシ テンサイモグリハナバエ アブラムシ類	100～ 200倍	1ℓ/ペー パーポッ ト1冊(3 ℓ/m ²)	定植前	1回	灌注	4回以内 (定植前の灌 注は1回以 内、散布は3 回以内)	
	カメノコハムシ テンサイモグリハナバエ アブラムシ類	2000～ 4000倍		14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
豆 類 (種実,但し, だいず, あずき, いんげんまめ, らっかせい を除く)	アブラムシ類			7日前 まで				
								あ ず き
いんげんまめ	アブラムシ類 カメムシ類 インゲンマメゾウムシ			前日まで				
	だ い ず							マメシンクイガ
豆 類 (未成熟, 但し, えだまめ を除く)	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ			3日前 まで				
	えだまめ							アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ
オ ク ラ	アブラムシ類			4000倍				3日前 まで
ほうれんそう								
み つ ば								3回以内
パ セ リ		1回						
せ り		2回以内						

[illegible]

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数
ば ら	アザミウマ類	2000～ 4000倍	100～ 300 ℓ	発生初期	4回以内	散布	4回以内
	コガネムシ類	2000倍	1 ℓ /m ²			生育期 株元灌注	
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類 アザミウマ類	2000～ 4000倍	100～ 300 ℓ		5回以内	散布	5回以内
デ イ ゴ	デイゴヒメコバチ	2000倍	200～ 700 ℓ				
げつきつ	ミカンキジラミ	40倍	200ml / 樹	生育期	6回以内	樹幹散布	6回以内
つつじ類	ツツジグンバイ	2000～ 4000倍	100～ 300 ℓ	発生初期		散布	
たであい	アブラムシ類	2000倍			4回以内		
わ た					2回以内		

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数 又は使用量	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数
水田作物, 畑 作 物 (休耕田)	ヨシ, オギ, ススキ, セイタカアワダチソウ 等の多年生雑草が優占 している休耕田	カメムシ類	4000倍	60 ～ 150 ℓ	—	4 回 以内	散布	4回以内