

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	メバコピウムを含む 農薬の総使用回数
か ん き つ	灰色かび病	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700 ℓ	開花期～幼果期 但し、収穫 90 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
り ん ご	黒星病	2000 ～ 6000 倍		21 日前まで	5 回以内		5 回以内
	斑点落葉病	2000 ～ 4000 倍					
	うどんこ病 モニリア病	2000 倍					
な し	黒星病						
も も	灰星病 黒星病						

- 蚕に対する残毒安全日数は2日である。
- 共通注意事項6. 街路・公園・堤とう等で使用する
場合の注意事項を参照。



作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	メバニドリムを含む 農薬の総使用回数
ぶ ど う	灰色かび病	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700 ℓ	30 日前まで	2 回以内		2 回以内
か き	うどんこ病			14 日前まで	5 回以内		5 回以内
び わ				7 日前まで	3 回以内		3 回以内
あ ず き	灰色かび病	2000 倍		14 日前まで	5 回以内		5 回以内
いんげんまめ		2000 ～ 3000 倍					
ね ぎ	小菌核腐敗病	2000 倍					
き ゆ う り	褐斑病 うどんこ病 灰色かび病	2000 ～ 3000 倍	前日まで				
す い か メ ロ ン	うどんこ病						
か ぼ ち ゃ ト マ ト ミニトマト	灰色かび病						
な す	うどんこ病 灰色かび病						
ピ ー マ ン		2000 倍	5 ℓ		3 回以内	常温 煙霧	3 回以内
い ち ご	うどんこ病	2000 ～ 3000 倍					
		50 倍					
			2000 ～ 3000 倍	100 ～ 300 ℓ	14 日前まで		
マ ン ゴ ー	灰色かび病	2000 倍	200 ～ 700 ℓ				
ラズベリー			前日まで				
花き類・観葉植物 (ばら、スターチス、 宿根かすみそう、ゆり、 りんどうを除く)	灰色かび病	2000 ～ 3000 倍	100 ～ 300 ℓ	発病初期	5 回以内	散布	5 回以内
ば ら	灰色かび病 黒星病 うどんこ病						
ゆ り	葉枯病 灰色かび病						
ス タ ー チ ス 宿根かすみそう	灰色かび病 うどんこ病	2000 倍	200 ～ 700 ℓ		5 回以内		5 回以内
り ん ど う	灰色かび病	2000 ～ 3000 倍					
	黒斑病 褐斑病	2000 倍					
樹 木 類 (かしを除く)	うどんこ病 灰色かび病		5 回以内		5 回以内		
か し	うどんこ病 灰色かび病 紫かび病						