

<b>グルホシネート液剤</b> <b>バスタ液剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> B A S F  <b>原体メーカー：</b> B A S F
<b>成分：</b> グルホシネート〔アミノ酸系〕……………18.5% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム〔PRTR・1種〕……………21.0%	<b>性状：</b> 青緑色澄明水溶性液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- 非選択性茎葉処理型除草剤で、葉及び緑色茎部から吸収され速やかに枯らす。
- イネ科，広葉雑草を問わず，一年生，多年生雑草のほとんど全ての生育中の雑草に卓効を示す。特にスギナに対しては通常濃度（100～150倍）で高い効果を示す。
- 散布後2～5日後には微候が現われ通常7～14日で効果完成という強力な殺草力を示す。また多年生雑草も地上部枯死後再生を長期間抑える。
- 土壌に落下した成分は土壌に吸着され，微生物によって速やかに分解されるので土壌中に長期間蓄積されるおそれが少なく，すぐに後作物のは種定植ができる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 土壌に落下すると効果がないので，薬液が雑草

の茎葉全体に均一にかかるように散布する。また雑草が大きくなりすぎると効果が低下するので時期を失ないように散布する。

- 散布後6時間以内の降雨は効果を減じることがあるので天候をよく見極めてから散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（芝）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（農作物，樹木，野菜）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	グルホシネート及びグル ホシネートPを含む 農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
小 麦	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 750ml	100～ 150ℓ	1回	雑草 茎葉 散布	4回以内 (は種後は 3回以内)
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 雑草生育期)	300～ 500ml		3回 以内		
—			は種前 (雑草生育期)			1回		
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)			300～ 500ml		
—			は種前 (雑草生育期)					3回 以内
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)					
—			は種前 (雑草生育期)			3回 以内		
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)					3回 以内
—			は種前 (雑草生育期)	3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					
—		は種前 (雑草生育期)			3回 以内			
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)		3回 以内				
—		は種前 (雑草生育期)	3回 以内					
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)			3回 以内			
—		は種前 (雑草生育期)		3回 以内				
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)	3回 以内					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
きゅうり なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご	－	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)	300～ 500㎖	100～ 150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内		
すいか ねぎ たまねぎ ブロッコリー ズッキーニ にがうり			2回以内			2回以内				
だいこん								収穫45日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	3回以内	3回以内
はつかだいこん たかな ほうれんそう								収穫7日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)		
みつば みしまさいこ			収穫30日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)			2回以内		2回以内		
メロン レタス 非結球レタス かぼちゃ ごぼう			収穫前日まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)			3回以内		3回以内		
にんじん オクラ			収穫前日まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理)			2回以内		2回以内		
アスパラガス			収穫打ち切り後 (雑草生育期)			3回以内			3回以内	
			さといも やまのいも							収穫30日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)
かんしょ			収穫14日前まで (雑草生育期挿苗前又は畦間処理)	200～ 500㎖				2回以内		2回以内
こんにゃく			雑草生育期植付前又は植付後萌芽前	200～ 300㎖		3回以内		3回以内		
			収穫30日前まで (雑草生育期畦間処理)	300～ 500㎖						
ばれいしょ			雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前	100～ 200㎖		1回		3回以内 (萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)		
			収穫21日前まで (畦間処理：雑草生育期)	300～ 500㎖		2回以内				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	グルホシネート及びグ ルホシネート P を含む 農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
豆 類 (種実、但し、 だいずを除く)	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500 ml	100～ 150 ℓ	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
だ い ず			定植5日前まで (雑草生育期)					
			収穫28日前まで (畦間処理：雑草 生育期)					
			は種前 (雑草生育期)					
			は種後出芽前 (雑草生育期)					
			定植5日前まで (雑草生育期)					
			収穫28日前まで (畦間処理：雑草 生育期)					
			収穫28日前まで (株間処理：本葉 5葉期以降雑草生 育期)					
え だ ま め			は種前 (雑草生育期)					
			は種後出芽前 (雑草生育期)					
			定植5日前まで (雑草生育期)					
			収穫14日前まで (畦間処理：雑草 生育期)					
な ば な 類			収穫21日前まで (雑草生育期は種・ 定植前又は畦間 処理)			2回 以内		2回以内
か ぶ			は種前 (雑草生育期)					
			定植前 (雑草生育期)					
			収穫21日前まで (畦間処理：雑草 生育期)					
			は種前 (雑草生育期)					
に ら さやいんげん さやえんどう 実えんどう 未成熟そらめめ			定植前 (雑草生育期)					
			収穫前日まで (畦間処理：雑草 生育期)					
			3回 以内			3回以内		
	1回	1回						
し ろ う り	3回 以内	3回以内						
ほ う き ぎ	1回	3回以内						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
にんにく	－	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)	300～500 ml	100～150 ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
しょうが			3回以内			3回以内		
葉しょうが			収穫14日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)			2回以内		2回以内
食用ぎく			は種前 (雑草生育期)					
			定植前 (雑草生育期)					
			収穫14日前まで (畦間処理：雑草生育期)					
水田作物			耕起15日前まで (雑草生育期)			1回		1回
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草, 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	500～1000 ml		2回以内		2回以内
水田作物, 畑作物 (休耕田)	休耕田	雑草生育期 (草丈50cm以下)	3回以内	3回以内				
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	300～500 ml		1回		1回
セルリー	－	多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)	500～750 ml		3回以内		3回以内
さんしょう (果実)		雑草生育期：草丈30cm以下)	2回以内	2回以内				
しそ (花穂)		収穫14日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)	300～500 ml	3回以内		3回以内		
食用桑 (葉)		収穫45日前まで (雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前)						
食用桑 (果実)		収穫30日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)						
とうき		収穫7日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)						
とうき(葉)		収穫3日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)	2回以内	2回以内				
パセリ		収穫30日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	3回以内	3回以内				
もりあざみ		収穫120日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)	2回以内	2回以内				
ふき								

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	グルホシネート及びグ ルホシネートPを含む 農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ふ き (ふきのとう)	—	一年生雑草	収穫75日前まで (雑草生育期定植 前又は畦間処理)	300～ 500 ml	100～ 150 ℓ	2回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
た け の こ			収穫30日前まで (雑草生育期：草 丈30cm 以下)					
た ら の き			収穫45日前まで (雑草生育期：植付 前又は畦間処理)			3回 以内		3回以内
な た ね			収穫30日前まで (雑草生育期：は種 前又は畦間処理)			1回		
茶			摘採7日前まで (雑草生育期畦間 処理)			2回 以内		2回以内
花 き 類・ 観 葉 植 物			雑草生育期畦間 処理 (草丈20cm 以下)					3回以内
樹 木 類			雑草生育期	500～ 1000 ml	100～ 200 ℓ			
樹 木 等	公 園， 庭 園， 堤 とう， 駐 車 場， 道 路， 運 動 場， 宅 地， の り 面， 鉄 道 等	多年生雑草				1000～ 2000 ml		
日 本 芝 (こうらいしば)	—	一年生雑草	雑草生育期 芝休眠期	300～ 500 ml	100～ 150 ℓ	1回	雑草 茎葉 散布	1回
た ば こ			植付10日前まで (雑草生育期) 大土寄期 (雑草生育期畦面 ・畦間処理)	200～ 300 ml				
桑			雑草生育期春期萌 芽前及び夏切り後 萌芽前	300～ 500 ml		3回 以内		3回以内