

イソプロチオラン・フルトラニル粒剤 フジワンモンカット粒剤	取扱メーカー： 日産，日農 原体メーカー： 日農，日農
成分： イソプロチオラン〔ジチオラン系 PRTR・1種〕…12.0% フルトラニル〔カルボキシアミド系 PRTR・1種〕…7.0%	性状： 暗黄赤色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- いもち病，紋枯病を同時に防ぐ粒剤である。
- 効果の持続期間が長い。
- ドリフトの心配が少なく，住宅地，桑園周辺の水田防除に適する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 育苗箱には使用しない。
- 散布に当っては，田水深を3cm以上の湛水状態とし，散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち，散布後7日間は落水，かけ流しはしない。なお，極端な漏水田での使用はさける。

●本剤の使用適期は通常出穂20日前頃であるが，稲の品種あるいは地域により前後することがあり，また，多発時の散布は効果が劣る場合があるので，使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【薬効・薬害等の注意】

- 育苗箱には使用しない。

【安全対策上の注意】

- 眼に対して刺激性がある。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 魚類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。



【適用と使用法】

作物名	適用病害名	10 a 当り使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソプロチオランを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	3～4 kg	出穂30～10日前 但し，収穫30日前まで	2回以内	湛水 散布	3回以内 (移植前は1回以内， 本田では2回以内)	3回以内 (小包装投入は1回以内)
	稲こうじ病	4 kg					