スピネトラム水和剤 <b>ディアナ WDG</b>	<b>取扱メーカー</b> : 協友アグリ, サンケイ*, ホクサン, 住友化学 <b>原体メーカー</b> : 住友化学
成分: スピネトラム〔スピノシン系〕25.0%	性状:類白色水和性細粒 毒性:普通物 消防法:——

## 

- ●広い殺虫スペクトラムで,チョウ目害虫に対し, 防除効果を発揮する。
- ●ハマキムシ類に優れた効果を示し、各発育ステージ(卵・幼虫・成虫)に対し高い効果を示すので、散布幅が広く使いやすい。
- ●収穫前日まで使用が可能である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】……………

●抵抗性回避のため、スピノシン系薬剤は1作期 1回の散布にとどめ、他系統の薬剤とのローテーション防除を心掛ける。

## 【薬効・薬害等の注意】 …………

- ●散布量は対象作物の生育段階, 栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- ●散布液調製後はそのまま放置せず,できるだけ 速やかに散布する。

# 【安全対策上の注意】 ……………

●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参照。







# 

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スピネトラムを含む 農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ケムシ類 キリガ類	5000~ 10000倍		(MAII)			
	ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ	5000~ 15000倍					
	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類						
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類	5000~ 10000倍					
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類						
すもも	シンクイムシ類	5000倍					
	ハスモンヨトウ	10000倍	200 ~ 700 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類 ハマキムシ類 アザミウマ類 ハマキムシ類						
かんきつ	カキノへタムシガ ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類	5000~ 10000倍					
, h	ハスモンヨトウ	10000倍					
くり	モモノゴマダラノメイガ	5000倍					
いちじく	アザミウマ類 ショウジョウバエ類	10000倍					
う め ブルーベリー	ケムシ類 オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類	5000~ 10000倍					
アロニア	シンクイムシ類	10000倍					
	チャノキイロアザミウマ アザミウマ類	5000~ 10000倍					