

ジノテフラン・カスガマイシン・トリシクラゾール水和剤 ダブルカットスタークルフロアブル	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 三井アグロ、北興、ダウ
成分： ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………10.0% カスガマイシンー塩酸塩〔抗生物質〕……………1.37% （カスガマイシンとして……………1.20%） トリシクラゾール……………8.0%	性状： 黄赤色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用 時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60 ～ 200 ℓ	穂揃期 まで	散布	本剤 2 回以内 ジノテフラン 4 回以内 （育苗箱への処理及び側条 施用は合計 1 回以内，本田 での散布，空中散布，無人 へり散布は合計 3 回以内）
	いもち病 カメムシ類	300 倍	25 ℓ			カスガマイシン 4 回以内 （種子浸漬は 1 回以内，育 苗箱への処理は 1 回以内， 本田では 2 回以内）
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8 倍	800 ml		無人へりコ プターによ る散布 空中散布	トリシクラゾール 4 回以内 （育苗箱への処理は 1 回以 内，本田では 3 回以内）