

<b>エトフェンプロックス・トリシクラゾール・メプロニル粉剤 ビームバシボン粉剤 DL</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ  <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ，ダウ，クミカ
<b>成分：</b> エトフェンプロックス〔ピレスロイド系〕……………0.50% トリシクラゾール〔メラニン生成阻害〕……………1.0% メプロニル〔酸アミド系 PRTR・1 種〕……………3.0%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm 以下， 浮遊性指数20 以下
	<b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用方法】** ……………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用 方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 コブノメイガ アザミウマ類	3 ～ 4 kg	14 日前 まで	散布	本剤 3 回以内 エトフェンプロックス 3 回以内 トリシクラゾール 4 回以内 （育苗箱への処理は 1 回以内， 本田では 3 回以内） メプロニル 3 回以内
	カメムシ類 イネツトムシ 穂枯れ（ごま葉枯病菌）	4 kg			