

<b>イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル・チフルザミド粒剤</b> <b>シャリオ箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産 <b>原体メーカー：</b> バイエル、ダウ、住友化学・バイエル、日産
<b>成分：</b> イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% スピノサド〔スピノシン系〕……………1.0% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0% チフルザミド〔酸アミド系〕……………3.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	イネツトムシ ニカメイチュウ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	50g	移植2日前 ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 イミダクロプリド 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内) スピノサド 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内) チフルザミド 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)
	もみ枯細菌病 内穎褐変病		移植当日		

\* 育苗箱は 30×60×3cm，使用土壌約 5 ℓ