

ベンフラカルブ粒剤 グラントオンコル粒剤	取扱メーカー： O A T 原体メーカー： O A T
成分： ベンフラカルブ〔カーバメート系 PRTR・1 種〕……8.0%	性状： 淡褐色細粒 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】 ……………

- オンコル粒剤 5 の項参照。
- 有効成分の増量及び徐放性製剤によって、従来のオンコル粒剤 5 よりさらに長期間に渡り安定した効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- 育苗箱の上から均一に散布する。
- 苗に付着した粒剤は払い落とす。
- 軽く散水し粒剤を培土表面におちつかせる。
- 運搬～田植機装着の作業中に粒剤が落ちないように注意する。

〈れんこんでの普及方針〉

- 漏水田では使用しない。使用する場合は、事前に漏水対策をしっかりと行い隣接田への流出を防いでから処理する。
- 推奨される使用時期は、植付け直前の代かき時とする。
- 収穫前の圃場が多い 7～12 月は、隣接田への漏水やドリフトによる作物残留の危険性が高いため、使用しない。

- ハウス栽培では使用しない。
- 条掘り（筋掘り、残し掘り）した圃場では使用しない。
- 圃場全面に均一に散布し、土壌中に均等に分布するように処理当日中に速やかに混和する。
- 処理後 14 日間は落水・かけ流ししない。
- 処理後 6 カ月間（180 日間）は収穫しない。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

- オンコル粒剤 5 の項参照。

【安全対策上の注意】 ……………

- オンコル粒剤 5 の項参照。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。（水稲）



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベンフラカルブを含む 農薬の総使用回数
水 稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ ヒメトビウンカ セジロウンカ ニカメイチュウ イネツトムシ イネシンガレセンチュウ	育苗箱 (30 ×60×3 cm, 使用土壌約 5ℓ) 1箱 当り 50 g	移植3日前 ～移植当日	1 回	育苗箱の上 から均一に 散布する。	1 回
	イネカラバエ フタオビコヤガ イネヒメハモグリバエ		移植当日			
れんこん	レンコンネモグリセンチュウ	15 kg /10a	植付前 但し、 収穫180日 前まで		湛水散布後 全面土壌混 和	