

<b>フェンバレレート・マラソン水和剤</b> <b>ハクサップ水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，サンケイ*，住友化学， 一農，琉産 <b>原体メーカー：</b> 住友化学，住友化学
<b>成分：</b> フェンバレレート〔ピレスロイド系〕……………10.0% (S-S体及びR-R体の含量……………4.0%) マラソン〔有機リン系 PRTR・1種〕……………30.0%	<b>性状：</b> 淡褐色水和性粉末63μm以下 <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- フェンバレレートの極めて強い接触毒作用にマラソンの経口毒作用が加わり幅広い殺虫作用を備える。
- ピレスロイドの特長である速効的ノックダウン作用を備えている。また優れた残効性を備える。
- 特異な忌避作用（摂食阻害，産卵抑制など）により作物を害虫から守る。
- 殺虫スペクトラムが広く，害虫の全ての発育ステージに優れた効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 発生初期に散布する。
- 連用をさけ他剤との体系で使用する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- アルカリ性の強い薬剤との混用はさける。
- なすの幼苗期に使用すると，展開葉に黄化などの薬害を生じることがあるので，この時期の使用はさける。
- 幼苗期のキャベツ，はくさい，だいこん，レタス，リーフレタスには所定範囲内の低濃度で散布する。
- 適用作物の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- のど，鼻，皮膚などを刺激する場合，カユミを生じることがあるので注意する。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フェンバレートを含 む農薬の総使用回数	マラソンを含む 農薬の総使用回数				
かんしょ	ナカジロシタバ イモコガ エビガラスズメ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～ 300 ℓ	7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内	5 回以内				
さといも	ハスモンヨトウ	2000 倍		3 日前 まで				6 回以内				
なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類 オオタバコガ			前日まで					5 回以内			
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍			30 日前 まで		3 回以内	3 回以内		5 回以内		
	オオタバコガ	1000 倍										
ブロッコリー	アオムシ	2000 倍		前日まで	5 回以内		5 回以内					
はくさい	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ カブラハバチ	1000～ 2000 倍						35 日前 まで	3 回以内		3 回以内	6 回以内
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍										
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ	1000～ 2000 倍		3 日前 まで	2 回以内		2 回以内	5 回以内				
	アブラムシ類 オオタバコガ			1000 倍				2 回以内				
リーフレタス	アブラムシ類 オオタバコガ	1000～ 2000 倍		14 日前 まで	2 回以内		2 回以内	2 回以内				
		1000 倍										