

<b>アシベンゾラル S-メチル水和剤</b> <b>アクティガード顆粒水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> シンジェンタ  <b>原体メーカー：</b> シンジェンタ
<b>成分：</b> アシベンゾラル S-メチル……………50.0%	<b>性状：</b> 淡褐色水和性細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 植物の防御システムを活性化させることで病害から植物を守る。
- 定植前の処理により、難防除病害に負けない生育環境に整える。
- 処理後、速やかに作用。植物全体に浸透移行し、新展開葉にも効果を発揮する。
- ユニークな作用機構で耐性菌対策にも効果的。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 本剤の分包1包(1g)で希釈液5ℓ分(5000倍液)＝セルトレイ10枚分。ジョウロなどを使い、セルトレイに灌注処理をする。
- 薬剤処理済み苗を速やかに定植するため、定植直前の処理がおすすめ。
- 病害を防除するため、定植後は散布剤を使用した体系防除を行う。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- キャベツ、はくさいに使用する場合、生育初期に生育遅延、葉の黄化、矮化などの症状が一時的に生じる場合があるので、以下のことに注意する。
  - 健苗に使用し、軟弱徒長苗には使用しない。
  - 培土が極端に乾燥している場合は、薬剤処理前に適度に灌水をする。
- 夏期高温時の使用をさける。

### 【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- カブレやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- すべての分包容器を使いきるまでは、必ず分包容器を外装に収納し保管する。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アシベンゾラル S-メチルを含む農薬の総使用回数
キャベツ	黒斑細菌病	5000倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(約30×60cm, 使用土壌約1.5～4ℓ) 当り0.5ℓ	定植前日～定植当日	1回	灌注	1回
はくさい							