

<b>ペンチオピラド・TPN 水和剤</b> <b>ベジセイバー</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興、三井アグロ  <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ、エス・ディー・エス
<b>成分：</b> ペンチオピラド〔コハク酸脱水素酵素阻害剤〕……6.4% TPN〔有機塩素系 PRTR・1 種〕……40.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】 ……………

●幅広い病害スペクトラムを有し、子囊菌類、不完全菌類、担子菌類に加え藻菌類の主要病害を防除する。

- 既存薬剤耐性菌に有効である。
- 優れた予防効果、残効性を有する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 ……………

- 発病前から発病初期の早めの散布により安定した効果が得られる。
- 作用性の異なる薬剤とのローテーション散布を行う。
- 薬液が十分かかるように散布する。
- 耕種防除との併用で効果が一層高まる。

### 【薬効・薬害等の注意】 ……………

- 使用前によく振ってから使用する。
- ストレプトマイシン剤及びホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加える。

●薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。

### 【安全対策上の注意】 ……………

●魚類に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時に薬剤が眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。

●皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ベンチオビラドを含 む農薬の総使用回数	TPN を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	べと病 株腐病 菌核病	1000 倍	100～ 300 ℓ	14 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内	3 回以内 (は種又は定植 前の土壌混和は 1 回以内, 散布 及びエアゾル剤 の噴射は合計 2 回以内)
はくさい	黒斑病 白斑病 白さび病 べと病 菌核病			7 日前 まで				3 回以内 (は種又は定植 前の土壌混和は 1 回以内, 散布 は 2 回以内)
ブロッコリー	菌核病 べと病			出蕾前 但し, 収穫 21 日前まで				3 回以内 (土壌灌注は 1 回以内, 散布は 2 回以内)
す い か	うどんこ病 つる 枯病 炭疽病 菌核病			3 日前 まで	5 回以内			
メ ロ ン	べと病 うどんこ病 つる 枯病							
きゅうり	べと病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病 黒星病							
かぼちゃ	うどんこ病 つる 枯病			前日まで				10 回以内 (土壌灌注は 2 回以内, 散布及 び常温煙霧及び くん煙及びエア ゾル剤の噴射は 合計 8 回以内)
ト マ ト	疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病			7 日前 まで				3 回以内
ミニトマト	斑点病			前日まで	2 回 以内			6 回以内 (土壌灌注は 2 回以内, 散布及 びくん煙及びエ アゾル剤の噴射 は合計 4 回以内)
な す	うどんこ病 灰色かび病 すすかび病 菌核病 黒枯病				3 回 以内			2 回以内
ピーマン	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 黒枯病 斑点病	4 回以内						

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ベンチオビラドを含む 農薬の総使用回数	TPN を含む農薬の 総使用回数
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000 倍	100～ 300 ℓ	7 日 前 ま で	4 回 以 内	散布	4 回 以 内	6 回 以 内
ね      ぎ	べと病 さび病 白絹病 葉枯病 黒斑病 小菌核腐敗病			14 日 前 ま で	2 回 以 内		4 回 以 内 (株元灌注は 2 回 以 内, 散布は 2 回 以 内)	4 回 以 内 (土壌灌注は 1 回 以 内, 散布 は 3 回 以 内)
					3 回 以 内		3 回 以 内	5 回 以 内 (土壌灌注は 2 回 以 内, 散布 は 3 回 以 内)
レ   タ   ス	べと病 菌核病 すそ 枯病			21 日 前 ま で	2 回 以 内			2 回 以 内
リーフレタス	灰色かび病							
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病			前日 まで	4 回 以 内		4 回 以 内	4 回 以 内
き      く	白さび病			発病前～ 発病初期	3 回 以 内		3 回 以 内	6 回 以 内