

ストレプトマイシン液剤 ストマイ液剤20	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： Meiji
成分： ストレプトマイシン硫酸塩〔抗生物質〕……………25.0% （ストレプトマイシンとして… 20.0%）	性状： 黄褐色粘稠水溶性液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 植物体内を浸透移行する性質があり広範囲のグラム陽性及び陰性菌に優れた殺菌力を示す。
- pH 3～7で安定である。
- たばこ、野菜、果樹などの細菌性病害防除剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と輪番で使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤などの強アルカリ性薬剤及び石灰、タルク、ペントナイトなどの吸着性増量剤を

含有する薬剤との混用はさける。

- 高温時の使用はさける。
- ぶどう（ジベレリン液に添加）に使用する場合は、第1回目ジベレリン処理時にジベレリン液に添加処理し、第2回目ジベレリン処理（単用）を必ず行う。展着剤は加用しない。また、薬液は使用の都度調製し、なるべく調製当日に使用し、調製液はなるべく日陰に置く。
- 適用作物（たばこ、はくさい、こんにゃく、もも）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬効・薬害の有無を十分確認してから使用する。

【安全対策上の注意】……………



【適用と使用方法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを 含む農薬の総使用回数
たばこ	野火病	1000～2000倍	——	——	散布	——
はくさい	軟腐病		14日前まで	3回以内		3回以内
こんにゃく	腐敗病	1000倍	30日前まで	6回以内		6回以内 (種いもへの処理は1回以内)
もも	せん孔細菌病	1000～2000倍	60日前まで	2回以内	5～10秒間 種いも浸漬	2回以内
ばいしょ	そうか病 黒あし病	100倍	植付前	1回		5回以内 (種いもへの処理は1回以内)
作物名	使用目的	使用濃度	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを 含む農薬の総使用回数
ぶどう	無種子化	1000倍 (200ppm)	満開予定日の 14日前～開花始期	1回	散布又は 花房浸漬	1回
			満開予定日の 14日前～満開期		花房浸漬 (第1回目ジベレリン処理と併用)	