

プロモブチド・ペントキサゾン剤 ショキニー (1キロ粒剤 / フロアブル / 250グラム)	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 住友化学，科研製薬
成分： プロモブチド〔酸アミド系〕 ……9.0% (粒剤)，18.0% (フロアブル)，24.0% (250 グラム) ペントキサゾン〔オキサゾリジンジオン系〕 ……2.0% (粒剤)，4.0% (フロアブル)，6.0% (250 グラム)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 淡褐色粒状 粒径3～8mm (250 グラム) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

●ホタルイ，ミズガヤツリなどのカヤツリグサ科雑草に特異的に効果が高い。またノビエ，コナギ，アゼナなどの水田一年生雑草全般に優れた殺草活性を示す水稲用初期除草剤である。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈粒剤〉

●田植作業と同時に薬剤を施用する田植同時施用も可能である。

〈フロアブル〉

●水中拡散性に優れるので，畦畔散布と水口施用ができる。

●田植作業と同時に薬剤を施用する田植同時施用も可能である。

〈250グラム〉

●粒径約5mmの豆つぶ製剤で，10 a 当りの使用量が250g と軽量，省力型である。

●フロアブルと同様の自己拡散型製剤で，水中拡散性が極めて優れているため水田の周縁部散布や水口施用が可能である。

●畦畔からのひしゃく散布，動力散布機での省力散布ができる。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

●共通注意事項の5，水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●中期剤や一発剤との体系で使用する初期除草剤である。

●雑草の発生前から発生始期に有効なので，ノビエの1葉期までに，時期を失ないように散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので，必ず適期に散布するようにする。

雑草名	散布適期		
	粒剤	フロアブル	250グラム
ホタルイ	1葉期まで	1葉期まで	発生始期まで
ミズガヤツリ		発生始期まで	
クログワイ	発生始期まで	発生前	—
へらオモダカ		—	発生始期まで
シズイ コウキヤガラ			—

〈粒剤・フロアブル〉

●クログワイに対しては発生期間が長く，遅い発生のものには効果を示さないのので，有効な後処理剤と組み合わせて使用する。

●田植同時施用：田植機に装着する専用散布機を使用する。田植終了後は水尻が確実に止まっていることを確認のうえ，直ちに所定の水深（5 cm 程度）まで入水し，水口をしっかり止める。田面の露出がないように注意する。

〈250グラム〉

●散布に当たっては，やや深めの湛水状態（水深5～6 cm）にして水の出入りを止める。

●水口施用の場合は，あらかじめ1～2 cm 程度水深を確保した状態で，入水時に水口に施用し，流入水とともに水田全面に拡散させ，施用後田面水が通常の湛水状態（湛水深3～5 cm）に達した時に必ず水を止め，田面水があふれ出ないように注意する。

●水口に対して風速5 m/s を超える向かい風が吹いている場合は，本剤の拡散が不十分になるおそれがあるため水口施用をさける。

●吸湿性があるので，散布時に降雨の場合には濡れないように注意して散布する。濡れた手で扱わない。開封後は早めに使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………
 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（れんこん、くわい、せり）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

〈250グラム〉

- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、周縁部散布をさけ水田全面に散布する。

【安全対策上の注意】……………
 〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

〈粒剤・250グラム〉

- 無人航空機及び無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】……………

①ショキニー 1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ シズイ コウキヤガラ	移植直後～ ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで	1kg	湛水散布又は無人 航空機による散布	1回※
		移植時		田植同時散布機で 施用	

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②ショキニーフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	移植時	500ml	田植同時散布機 で施用	1回※
		移植直後～ ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布又 は水口施用	
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ		300ml (少量散布)	原液湛水散布	

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

③ ショキニー 250 グラム

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	移植直後～ ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで	250 g	湛水散布，湛水周 縁散布，水口施用 又は無人ヘリコプ ターによる散布	1 回※

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数：2 回以内