

<b>ダイアジノン粒剤</b> <b>ダイアジノン粒剤3</b>	<b>取扱メーカー：</b> ホクサン、日本化薬  <b>原体メーカー：</b> 日本化薬
<b>成分：</b> ダイアジノン〔有機リン系 PRTR・1種〕……………3.0%	<b>性状：</b> 淡黄褐色細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 野菜害虫ではコガネムシ類、タネバエ、ウリバエなどの幼虫を始め各種の土壌害虫に高い効果を示す。
- ガス効果が強く速効的である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

#### 〈畑作物〉

- たばこに使用する場合植穴処理では薬害を生じることがあるのでさけ、作条の土壌になるべく幅広く散布し土壌とよく混和してから植付けろ。
- たばこは薬害を生じやすいので散布及び混和ムラがないように特に注意する。

#### 〈りんごのモモンカイガ〉

- 地表面に均一に散布する。
- 散布時期は夏まゆ営繭時から成虫発蛾初期が適期。必ずシンクイムシ防除剤による地上散布を併用する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

#### 〈畑作物の土壌害虫防除〉

- 植付前又はは種前に土壌全面又は作条に処理し、土壌とよく混和する。
- 作条処理の場合は面積に応じて量を減らす。
- 作付前処理は土壌とよく混和し、作付後処理は散布後軽く覆土する。
- 適用作物（たばこ）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（なつみかん、かぶ、ごぼう、しゅんぎく、茶）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 魚類に低濃度でも影響を及ぼすので注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む 農薬の総使用回数			
かんしょ	コガネムシ類幼虫	5～10kg	作付け前 及び収穫30 日前まで	3回以内	土壌混和	3回以内 (マイクロカプセル 剤の植付前の処理は 1回以内、マイクロ カプセル剤の散布は 2回以内、粒剤の散 布は2回以内)			
	ケラ ネキリムシ類	6～9kg	植付前	1回		3回以内 (植付前の土壌混和 は1回以内)			
コガネムシ類幼虫			5～10kg	収穫30日 前まで		2回以内	2回以内		
	ケラ ネキリムシ類	6～9kg					は種時又は 植付時	2回以内 (粒剤の生育期の処 理は1回以内)	
ばれいしょ	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回		2回以内			
							ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時
キャベツ	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	2回以内		3回以内 (生育期は2回以内)			
							ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時又は 植付時
カリフラワー ブロッコリー	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回		2回以内			
							ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時又は 植付時
レタス	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回		2回以内			
							ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時又は 植付時
はくさい	コガネムシ類幼虫	5～6kg	は種時又は 植付時	2回以内		3回以内 (生育期は2回以内)			
							ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時又は 植付時
トマト ピーマン とうがらし類	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回		2回以内			
							タネバエ	5～8kg	は種時又は 植付時
きゅうり	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回		4回以内 (粒剤の生育期の処 理は3回以内)			
							ケラ ネキリムシ類 ウリハムシ幼虫	6～9kg	は種時又は 植付時
すいか かぼちゃ メロン	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	2回以内		3回以内 (粒剤の生育期の処 理は2回以内)			
							タネバエ	5～8kg	は種時又は 植付時
なす	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回	2回以内 (生育期は1回以内)				
						ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時又は 植付時	2回以内
だいこん はつかだいこん	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	1回	2回以内				
						ケラ ネキリムシ類	6～9kg	は種時又は 植付時	2回以内
ねぎ わけぎ あさつき	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	2回以内	2回以内				
						タネバエ	5～8kg	は種時又は 植付時	2回以内
たまねぎ	コガネムシ類幼虫	5～10kg	は種時又は 植付時	2回以内	2回以内				
						タネバエ	5～8kg	は種時又は 植付時	2回以内
						ケラ コオロギ	3～5kg		
						タマネギバエ	5～10kg	は種時又は 植付時	2回以内

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む 農薬の総使用回数
い ち ご	コガネムシ類幼虫	6～9kg	植付時 (仮植床)	1 回	土壌混和	2回以内
豆類(種実)	ケラ コガネムシ類幼虫 タネバエ	5～9kg	は種時			だいいずは6回以内 (種子粉衣は1回以 内, 粒剤は5回以内 (生育期の処理は4 回以内)), あずきは 4回以内 (種子粉衣 は1回以内, は種時 の処理は1回以内, 生育期の処理は3回 以内), いんげんま めは3回以内 (種子 粉衣は1回以内, 粒 剤は2回以内), らっ かせいは1回, 上記 以外の 豆類 (種実) は4回以内 (種子粉 衣は1回以内, 粒剤 は3回以内)
た ば こ	コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 ハリガネムシ類	6～9kg	植付前			1 回