

<b>エスプロカルブ・ジフルフェニカン粉粒剤</b> <b>バンバン細粒剤 F</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産  <b>原体メーカー：</b> 日産、バイエル
<b>成分：</b> エスプロカルブ〔カーバメート系〕……………6.0% ジフルフェニカン〔ニコチンアニリド系〕……………0.15%	<b>性状：</b> 淡褐色細粒及び微粒180～710μm <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- バンバン乳剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 雑草の発生前に散布する。
- 碎土、整地は丁寧に行い、覆土深が2～3cm以上となるように細かく砕いた土を用いて丁寧に覆土を行い、鎮圧してから散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 本剤を使用した圃場で後作物を栽培する場合には、耕起を十分に行う。
- 処理後に大量の降雨が予想される場合は使用しない。

- 周辺農作物や有用植物に薬害を生ずるおそれがあるので、飛散しないように注意して散布する。特に風の強い時の散布はさける。
- 適用作物への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用 雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
小麦 (秋播) 大麦 (秋播)	一年生 雑草	全土壌 (砂土を除く)	は種後出芽前～ 出芽前期 (雑草発生前)	3～5 kg	全面土壌 散布	全域 (北海道を除く)	1回 ※

※エスプロカルブを含む農薬の総使用回数：1回

※ジフルフェニカンを含む農薬の総使用回数：1回