

カルタップ・クロチアニジン・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド粉剤 ハスラー粉剤 DL	取扱メーカー： 協友アグリ，住友化学 原体メーカー： 住友化学，住友化学，住友化学，住友化学
成分： カルタップ塩酸塩〔ネライストキシン系 PRTR・1種〕…2.0% クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………0.15% バリダマイシン A〔抗生物質〕……………0.30% フェリムゾン〔PRTR・1種〕……………2.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………1.5%	性状： 類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ いもち病	3～4 kg	21 日前 まで	散布	本剤 2 回以内 カルタップ 6 回以内 （浸種前は1回以内，浸種後 から直播では種時又は移 植時までの処理は1回以内） クロチアニジン 4 回以内 （直播では種時又は移植時 までの処理は1回以内，本田 での散布，空中散布，無人 航空機散布は合計3回以内） バリダマイシン 6 回以内 （育苗箱灌注は1回以内，本 田では5回以内） フェリムゾン 2 回以内 フサライド 3 回以内
	コブノメイガ カメムシ類 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(カーブラリア菌) 内穎褐変病	4 kg			