

フジワン水和剤

成分：イソプロチオラン……40.00%

毒性：普通物

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソプロチオランを含 む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病	25 倍	育苗箱 (30×60 ×3cm, 使用土 壌約5ℓ) 1 箱 当り 500 ml	緑化期～移 植直前まで	1 回	灌注	3 回以内 (移植前は 1 回以内, 本田では 2 回 以内)
	いもち病 (苗いもち)	50～ 100 倍		緑化始期			
稲	いもち病	1000 倍	60～150 ℓ /10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	
		30 倍	3 ℓ/10a			空中散布	

作物名	使用目的	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	イソプロチオランを含 む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ムレ苗防止	50～ 100 倍	育苗箱 (30×60 ×3cm, 使用土 壌約5ℓ) 1 箱 当り 500 ml	緑化始期	1 回	灌注	3 回以内 (移植前は 1 回 以内, 本田では 2 回以内)
	根の伸長及 び発根促進						
カーネーション	分枝促進	300～ 600 倍	3 ℓ /m ²	定植時	2 回以内	土壌 灌注	3 回以内 (浸漬は 1 回以 内, 土壌灌注は 2 回以内)
				定植時及び定 植の 2 ヶ月後			

〔取扱メーカー〕 日農