

<b>プロメトリン・I P C乳剤</b> <b>ビンサイド乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> ホクサン  <b>原体メーカー：</b> 日本化薬・シンジェンタ、保土谷
<b>成分：</b> プロメトリン〔トリアジン系〕……………15.0% I P C〔カーバメート系〕……………25.0%	<b>性状：</b> 淡黄色澄明可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

- タニソバを含むタデ類とハコベ、オオツメクサ等に特効的に作用し、枯殺する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 所定量・使用時期を厳守する。
- 生長した雑草にはほとんど効果がないので、は種後雑草発生前に処理する。
- 多年生雑草又は深根性雑草には効果が期待できない。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 砂質土又は水はけのよい土壌では薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
- 土壌温度、湿度により影響を受け、特に高温乾燥時期及び散布後高温が予想されるような条件下では薬害又は効果不足を生じるおそれがあるので使用をさける。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	適用地帯	本剤の使用回数
				薬量	希釈水量			
あ ず き いんげんまめ だ い ず	畑地一年生 広葉雑草	砂壤土 ～埴土	は種後 2～5日	330～ 400 ml	100 l	全面土壌 散布	北海道	1回 ※

※プロメトリンを含む農薬の総使用回数：1回  
 ※I P Cを含む農薬の総使用回数：1回

●は種深度が浅いと作物に薬害を起こしやすいのでは種後、覆土は丁寧に行い、覆土深は3cm程度にする。

●薬液飛散による他作物への薬害を防止するため、近くに広葉作物がある場合は、散布液が飛散しないよう特に注意して散布する。

●適用作物（あずき、いんげんまめ、だいず）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（農作物など）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

●カラートンにかかると変色させるおそれがあるので注意する。

