

<b>トルピラレート水和剤</b> <b>ブルーシアフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> 石原、ホクサン  <b>原体メーカー：</b> 石原
<b>成分：</b> トルピラレート〔ピラゾール系〕……………10.4% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム〔PRTR・1種〕…2.2%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第3石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

- 一年生イネ科雑草、及び一年生広葉雑草と幅広い草種に優れた効果を発揮する。
- 問題雑草の「イチビ」や「イヌホオズキ」にも優れた効果を示す。
- とうもろこしに高い選択性を持つため、とうもろこしの生育期に雑草茎葉散布が可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候に注意する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布後、一時的にクロロシス症状を生じることがあるが、その後の生育、収量には影響しない。

### 【安全対策上の注意】……………



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	トルピラレートを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
飼料用とうもろこし	一年生雑草	とうもろこし 3～5葉期 但し、収穫 45日前まで	40～ 50 ml	通常散布 50～100 ℓ 少量散布 25～50 ℓ	1回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1回
		とうもろこし 6～7葉期 但し、収穫 45日前まで	50～ 75 ml	100～ 150 ℓ			