

フェンメディファム水和剤 ビートアップフロアブル	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： U P L
成分： フェンメディファム〔カーバメート系 PRTR・1種〕…16.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- てんさい専用の除草剤である。
- 広葉雑草シロザ、ハコベに対して高い効果を示す。
- フロアブル製剤のため臭いが気にならない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 茎葉処理剤なので、雑草の発生後に処理する。但し、雑草が大きくなると効果が劣るので適期に散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- 適用作物（てんさい）の薬害などの注意事項は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（農作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 散布直後に降雨が予想される場合には使用をさける。

【安全対策上の注意】

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。

【適用と使用法】

作物名	適用 雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	フェンメディファムを 含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
てんさい (移植栽培)	一年生 広葉雑草	育苗期の本葉展開後 (雑草発生初期)	0.5～0.75 ml / m ²	150ml / m ²	3回 以内	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	3回以内
			1.0～1.5 ml / ペーパー ポット 6冊 (0.5 ～0.75 ml / m ²)	300ml / ペーパー ポット 6冊 (150ml / m ²)			
移植活着後、中耕後 雑草発生揃期 但し、 収穫60日前まで		400～ 600ml	50～ 100 ℓ				
第2本葉展開後、中耕 後雑草発生揃期 但し、 収穫60日前まで							
てんさい (直播栽培)		子葉展開期～本葉抽出 期雑草発生揃期 但し、 収穫60日前まで	200～ 350ml				