# エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 トレボン MC

取扱メーカー:

三井アグロ

**原体メーカー**: 三井アグロ

成分:エトフェンプロックス [ピレスロイド系 PRTR・1種] …20.0%

性状: 白色水和性粘稠懸濁液体

毒性:普通物消防法:——

#### 

- ●有効成分を薄い膜で包み、微細なカプセルとして水に懸濁した製剤。有機製剤臭が少く扱い易い。
- ●水稲の各種害虫に防除効果を発揮するほか、 きゅうり、なす、キャベツ、だいず等の野菜や、 樹木類の害虫防除にも有効。。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

#### 【使用上のポイント】……………

- ●使用前によく振ってから使用する。
- ●本田の水稲に対して希釈倍数600倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。

## 【安全対策上の注意】 ……………

- ●甲殻類、冷水魚に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。 養殖池等周辺での使用はさける。なお、比較的低 濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので 十分注意する。
- ●共通注意事項 6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合の注意事項を参照。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参照。
- ●共通注意事項 8. 適用作物群に対する注意事項 を参昭。







### 【適用と使用法】……

作物名	適用 場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数
稲		ウンカ類	1000~ 2000倍	60∼ 150ℓ	14日前まで	3回以内	散布	3回以内
		ツマグロヨコバイ						
		カメムシ類	2000倍					
		イネドロオイムシ						
		イナゴ類	1000倍					
		コブノメイガ						
		ウンカ類	600倍	25 ℓ				
		ツマグロヨコバイ						
		カメムシ類						
だいず	_	カメムシ類			14日前まで	2回以内		2回以内
えだまめ		ハスモンヨトウ						
んたよめ		マメシンクイガ						
ばれいしょ		アブラムシ類			7日前まで			
35 .a. ≥ b			1000 87	100∼				
きゅうり		ウリノメイガ	1000倍	300 ℓ	前日まで	3回以内		3回以内
なす		アブラムシ類						
キャベツ		ハイマダラノメイガ			3日前まで			
		アオムシ						
		ヨトウムシ						

作物名	適用 場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数
はくさい だいこん てんさい		アブラムシ類 ヨトウムシ ヨトウムシ	1000倍	100 ∼ 300 ℓ	7日前まで 21日前まで 14日前まで	3回以内		3回以内
樹 木 類 (つつじ類, いぬまきを除く) つつじ類	_	ケムシ類 ツツジグンバイ ケムシ類	2000~ 4000倍 1000倍 2000~	100 ~ 700 ℓ		6回以内	散布	6回以内
いぬまき		ケブカトラカミキリ	4000倍		_			
水田作物, 畑作物 (休耕田)	ヨスイダの雑占るオキ、カックチ多草し休オ・カック年がて耕	カメムシ類	2000倍	60∼ 150ℓ		3回以内		3回以内