

<b>メトコナゾール水和剤 ワークアップフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興  <b>原体メーカー：</b> クレハ
<b>成分：</b> メトコナゾール〔エルゴステロール生合成阻害剤〕…18.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】 .....

- ワークアップ粉剤D Lの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- 麦類に対して希釈倍数500倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- 適用外作物（なす科作物，うり科作物，あぶらな科作物及びまめ科作物）への薬害などの注意は、「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	メトコナゾールを含 む農薬の総使用回数
麦 類	黒点病	2000～ 4000倍	60～ 150 ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	赤さび病 うどんこ病 雪腐小粒菌核病 網斑病	2000倍					
	赤かび病	2000～ 3000倍					
		500倍					
			10～16倍			0.8 ℓ	
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	2000倍	100～ 300 ℓ	前日まで		散布	