

モゲトン粒剤

成分：ACN……9.0%

毒性：普通物

【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	ACNを含む農薬 の総使用回数
移植水稻	ウキクサ類	ウキクサ類, 藻類の 発生始～発生盛期 但し, 収穫45日前まで	2 ～ 3 kg	3 回以内	湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散 布	3 回以内
	藻類 (アオミドロ, アミミドロ)		2 kg			
	藻類による 表層はく離		藻類・表層はく離の 発生時 但し, 収穫45日前まで		1 ～ 2 kg	
	ウリカワ	ウリカワの増殖初期 (2～4葉期) 但し, 収穫45日前まで	3 ～ 4 kg			
	ヒルムシロ	ヒルムシロの 発生始～増殖始 但し, 収穫45日前まで				
	直播水稻	アオミドロ・ 藻類による 表層はく離	稲1 葉期以降, アオミドロ, 表層 はく離発生時 但し, 収穫45日前まで		1.5 ～ 2 kg	
れんこん	ウキクサ類	ウキクサ類の 発生始～発生盛期 但し, 収穫45日前まで	2 ～ 3 kg			
せり	藻類 (アオミドロ, アミミドロ)	ウキクサ類, 藻類の 発生始～発生盛期 但し, 収穫45日前まで				
くわい	ウキクサ類	ウキクサ類の 発生始～発生盛期 但し, 収穫60日前まで	3 kg	1 回		1 回

〔取扱メーカー〕 カネショウ