

ピリフルキナゾン水和剤 コルト顆粒水和剤	取扱メーカー： クミカ、日農 原体メーカー： 日農
成分： ピリフルキナゾン〔アミノキナゾリン系〕……………20.0%	性状： 褐色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 速やかに吸汁行動に影響を及ぼし、高い摂食阻害活性を示す。
- 従来の殺虫剤にない新しい作用を有し、有機リン剤、カーバメート剤、合成ピレスロイド剤、ネオニコチノイド剤などの薬剤に対して感受性の低下した害虫に対しても有効。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性の強い薬剤との混用はさける。
- ぶどうの幼果期以降に使用する場合は、果粉の溶脱を生じるおそれがあるので注意する。

- 西洋なしの品種ル レクチュでは落花後から袋かけ前までの散布については果実に葉斑を生じるおそれがあるので使用をさける。
- おうとうに使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので注意する。
- 共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性がある。
- 共通注意事項 7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ピリフルキナゾンを含む 農薬の総使用回数
か ん き つ	アブラムシ類	4000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	チャノキイロアザミウマ	3000 倍					
	コナジラミ類						
	ミカンバエ成虫						
り ん ご	カイガラムシ類 (アカマルカイガラムシを除く)	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アカマルカイガラムシ	2000 倍					
	アブラムシ類	3000 ～ 6000 倍					
	カイガラムシ類	3000 ～ 4000 倍					
	リンゴワタムシ	3000 倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ピリフルキナゾンを含 む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類 チュウゴクナシキジラミ	4000 倍	200 ～ 700 ℓ		3 回以内		3 回以内
	カイガラムシ類	3000 ～ 4000 倍					
	チャノキイロアザミウマ	3000 倍					
アブラムシ類	4000 倍	2000 ～ 3000 倍					
カイガラムシ類							
カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ							
ぶどう	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ	3000 倍					
キウイフルーツ	クワシロカイガラムシ						
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000 倍					
おうとう	カイガラムシ類						
	オウトウショウジョウバエ	10000 倍					
小粒核果類	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍	100 ～ 300 ℓ	前日まで	散布	3 回以内	
	カイガラムシ類	2000 倍					
いちご	アブラムシ類	3000 ～ 4000 倍					
トマト	コナジラミ類						
ミニトマト							
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類						
オクラ							
ピーマン		4000 倍					
とうがらし類 (甘長とうがらしを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類						
甘長とうがらし きゅうり メロン すいか かぼちゃ							
ばれいしょ	アブラムシ類	4000 ～ 8000 倍	7 日前まで 前日まで 3 日前まで	3 回以内		3 回以内	
かんしょ	コナジラミ類 アブラムシ類	4000 倍					
	アブラムシ類						
やまのいも	アブラムシ類						
しろうり	コナジラミ類						
にがうり	アブラムシ類						
キャベツ	ネギアザミウマ	3000 倍					
レタス		3000 ～ 4000 倍					
非結球レタス	アブラムシ類						
ブロッコリー		4000 倍					
はくさい							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ピリフルキナゾンを含 む農薬の総使用回数		
アスパラガス	コナジラミ類 ネギアザミウマ カスミカメムシ類	4000 倍	100～ 700 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内		
さやいんげん	コナジラミ類		100～ 300 ℓ		2 回以内		3 回以内	2 回以内	
さやえんどう	アブラムシ類	4000～ 6000 倍		3 日前まで				3 回以内	3 回以内
未成熟とうもろこし		4000 倍			前日まで				
ね ぎ	ネギアザミウマ	2000 倍		3 日前まで					
た ま ね ぎ	アブラムシ類	4000 倍			3 日前まで		3 回以内		
こ ん に や く	コナジラミ類			摘採 7 日前まで				2 回以内	2 回以内
しょうようほおずき	クワシロカイガラムシ	2000～ 3000 倍			200～ 400 ℓ				
茶	チャノミドリヒメヨコバイ	2000 倍		2000 倍					
	チャノキイロアザミウマ		2 回以内						
	チャトゲコナジラミ						2 回以内		
	アブラムシ類				2 回以内				
ツマグロアオカスミカメ		2 回以内							
花 き 類・ 観 葉 植 物	アブラムシ類		4000 倍	100～ 300 ℓ				発生初期	4 回以内
	コナジラミ類								
た ば こ	アブラムシ類			25～ 180 ℓ	10 日 前 ま で	2 回以内	2 回以内		