

テフリトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン剤 アットウZ (1キロ粒剤 / フロアブル)	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： 全農・バイエル・北興、協友アグリ、住友化学
成分： テフリトリオン〔トリケトン系〕2.0% (粒剤), 3.8% (フロアブル) ピラクロニル2.0% (粒剤), 3.8% (フロアブル) プロピリスルフロン〔スルホニルウレア系〕0.9% (粒剤), 1.7% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色水性和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】

〈共通〉

●クログワイやスルホニルウレア抵抗性オモダカ等、難防除の多年生雑草に対して優れた効果を発揮する。

●イボクサ、クサネム、アシカキ等の特殊雑草にも高い効果を示す。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈粒剤〉

●田植同時処理が可能である。

【使用上のポイント】

〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●ノビエの3葉期までに散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稲）及び適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい等）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。

【安全対策上の注意】

〈共通〉

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●藻類に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

●無人航空機散布・滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

雑草名	散布適期	
	粒剤	フロアブル
ホタルイ	3葉期まで	3葉期まで
ウリカワ		2葉期まで
へらオモダカ	—	
ミズガヤツリ	草丈20cm まで	
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ	再生期まで	
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで	
コウキヤガラ	発生始期まで	
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前	—

【適用と使用方法】.....

①アットウZ 1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	移植時	1kg	田植同時散布機で施用	1回 ※
	オモダカ クログワイ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布又は無人航空機による散布	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲2葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロピリスルフロンの含む農薬の総使用回数：2回以内

②アットウZフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布、 水口施用 又は 無人航空機による滴下	1回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロピリスルフロンの含む農薬の総使用回数：2回以内