

クロルピリホス乳剤 ダースバン乳剤40	取扱メーカー： クミカ、日産、一農 原体メーカー： ダウ
成分： クロルピリホス〔有機リン系 PRTR・1種〕……………40.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕……………26%〈23～28%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………23%〈21～26%〉	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 劇物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- 害虫に対し接触毒，食毒として効く。
- ハマキムシ類及びカイガラムシ類に高い効果を示し，広範な害虫に効く。
- 速効性に優れ，かつ残効性に優れる。
- ハマキムシ類の越冬卵にも効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ヤノネカイガラムシに対しては，発育が進むと効果が落ちるので若齢幼虫期に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤，ボルドー液などアルカリ性薬剤とは混用しない。
- だいたいの新葉に散布した場合，変色等の薬害を生じるおそれがあるので注意する。散布後の新たな展開葉には影響は認められない。
- かんきつでは，施設内での散布はひかえる。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類，甲殻類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルピリホスを含 む農薬の総使用回数		
み か ん (露地栽培)	ハマキムシ類 アブラムシ類	1500 倍	200 ～ 700 ℓ	30 日前まで	2 回 以内	散布	2 回以内		
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000 倍							
	カミキリムシ類幼虫	100 倍	20 ～ 70 ℓ			樹幹 散布			
かん き つ (みかん を除く)	ハマキムシ類 アブラムシ類	1500 倍	200 ～ 700 ℓ	60 日前まで	1 回		1 回		
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000 倍							
	ばれいしょ	アブラムシ類	1500 倍					100 ～ 300 ℓ	7 日前まで
だ い ず	ハスモンヨトウ マメシンクイガ	45 日前まで							
てん さい	ヨトウムシ カメノコハムシ アブラムシ類								
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1000 ～ 1500 倍	200 ～ 400 ℓ	摘採 14 日前まで					
	クワシロカイガラムシ	1000 倍	1000 ℓ						
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000 ～ 1500 倍	100 ～ 300 ℓ	21 日前まで					