

エチプロール粒剤 キラップ粒剤	取扱メーカー： バイエル、ホクサン 原体メーカー： バイエル
成分： エチプロール〔フェニルピラゾール系 PRTR・2種〕…2.0%	性状： 淡灰色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- 近年問題となっている斑点米カメムシ類に対し高い防除効果を示す。特に、カスミカメムシ類に対して卓効を示す。
- 散布適期幅が広い。
- 長い残効性を有しているので、安定した効果を示す。
- 粒剤タイプなので、ドリフトが少なく簡便に処理できる。
- 水田の主要な天敵であるクモ類、アメンボに対して影響が少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧」を参照。

【使用上のポイント】

- 出穂10日前頃から出穂期にかけて散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- 散布に当たっては、湛水状態（水深3～5cm）で均一に散布し、散布後少なくとも7日間は湛水状態を保ち、田面を露出させず、落水及びかけ流しをしない。

【安全対策上の注意】

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	エチプロールを含む 農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類	3 kg	14 日前まで	2 回以内	湛水散布	2 回以内 (は種時(直播) 又は移植時までの 処理は1 回以 内)