

オキサジクロメホン・クロメブロップ・ベンスルフロンメチル剤 ミスターホームラン (1キロ粒剤51/L ジャンボ)	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 全農、バイエル、クミカ
成分： オキサジクロメホン〔オキサジノン系 PRTR・1種〕…0.80%(粒剤), 1.6%(ジャンボ) クロメブロップ〔フェノキシ系〕……………3.5%(粒剤), 7.0%(ジャンボ) ベンスルフロンメチル〔スルホニルウレア系〕……………0.51%(粒剤), 1.02%(ジャンボ) その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム〔PRTR・1種〕……………1.2%(ジャンボ)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 類白色細粒, 水溶性パック入り 1パック50g(ジャンボ) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

- 一年生及び多年生の広葉雑草に高い効果を示す。
- スルホニルウレア系除草剤が効きにくくなったアゼナ類、コナギ、ホタルイに効果を示す。
- ノビエに対し高い効果を示すとともに、後次発生を長期間抑える。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの2.5葉期（ジャンボは2.0葉期まで）までに散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期	
	粒剤	ジャンボ
ホタルイ	2葉期まで	2葉期まで
ミズガヤツリ		発生始期まで (北陸、近畿・中国・ 四国の普通期及び 早期栽培地帯は2 葉期まで)
ウリカワ		発生始期まで
ヘラオモダカ		—
オモダカ	発生始期まで	
クログワイ		
ヒルムシロ	発生期まで (移植水稲の九州 の普通期及び早期 栽培地帯は発生前 ～発生始期まで)	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで	
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前	

〈粒剤〉

- オモダカ、クログワイは発生する期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
- 自然減水により田面の一部が露出する間際になったら、水尻は止めたままにし、通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じる。
- 田植同時処理で施用する場合、終了後はできるだけ速やかに入水する。

〈ジャンボ〉

- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。また、強く加圧されると包装材フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにする。
- 自然減水により田面の一部が露出する間際になったら、水尻は止めたままにし、通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じる。

【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい等、有用作物）への薬害の注意は「薬害注意事項解説」を参照。

〈粒剤〉

- 直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件では、薬害を生じるおそれがあるので注意する。

【安全対策上の注意】…………… 〈粒剤〉

- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の

2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈ジャンボ〉

●水溶性フィルム包装が破袋した場合は、誤食し

たり眼に入らないよう注意。

〈粒剤〉



【適用と使用法】.....

①ミスターホームラン1キロ粒剤51

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移 植 水 稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ（九州） クログワイ（北陸を除く） オモダカ ヒルムシロ（北陸を除く） セリ アオミドロ・藻類 による表層はく離 （北陸を除く）	壤土～ 埴土	移植時	1 kg	田植同時散 布機で施用	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通期 及び早期栽培 地帯	1 回※
		砂壤土	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで		湛水散布 又は無人 ヘリコプ ターによ る散布		
		壤土～ 埴土	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで				
			移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで				
直 播 水 稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	砂壤土 ～埴土	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで			全域	

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※クロメプロップを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

②ミスターホームランLジャンボ

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ （北陸を除く） セリ（北陸を除く） アオミドロ・藻類 による表層はく離 （北陸、九州を除く）	砂壤土 ～埴土	移植後3日～ ノビエ2葉期 但し、移植後 30日まで	小包装 （パック） 10個 （500g）	水田に 小包装 （パック） のまま投 げ入れる。	北陸、関東・ 東山・東海の 普通期及び早 期栽培地帯	1 回 ※
		壤土～ 埴土				近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	
		砂壤土 ～埴土	移植後5日～ ノビエ2葉期 但し、移植後 30日まで			九州の普通 期栽培地帯	
						九州の早期 栽培地帯	

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※クロメプロップを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内