

<b>シアントラニプロール・イソチアニル粒剤</b> <b>ルーチンパンチ箱粒剤</b>	取扱メーカー： クミカ*  原体メーカー： FMC, 住友化学・バイエル
成分：シアントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状：類白色細粒 毒性：普通物 消防法：——

**【適用と使用方法】** .....

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 シアントラニリプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (直播での場合は種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イネツトムシ コブノメイガ イナゴ類 イネヒメハモグリバエ ヒメトビウンカ 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病	育苗箱 (30×60 ×3cm, 使用土壌 約5ℓ) 1箱当り 50 g	は種前	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	本剤 1回 シアントラニリプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
			は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	は種前	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。		
		は種時 (覆土前)	育苗箱の上から均一に散布する。		