

クロチアニジン・イソチアニル・フラメトピル粒剤 箱大臣粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ，住友化学 原体メーカー： 住友化学，住友化学・バイエル， 住友化学
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………1.5% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0% フラメトピル〔酸アミド系〕……………4.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内，本田での散布，空中散布，無人航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内，本田では2回以内) フラメトピル 2回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内)
湛水直播水稲	いもち病 紋枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ キリウジガガンボ	1kg/10a	は種時	は種同時施 薬機を用い て土中施用 する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (は種時までの処理は1回以内，本田での散布，空中散布，無人航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (は種時までの処理は1回以内，本田では2回以内) フラメトピル 2回以内 (は種時までの処理は1回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	50g	移植7日前 ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (移植時までの処理は1回以内，本田での散布，空中散布，無人航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内，本田では2回以内) フラメトピル 2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

*育苗箱は30×60×3cm，使用土壌約5ℓ