

<b>PAP粉剤</b> <b>エルサン粉剤 2</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産  <b>原体メーカー：</b> 日産
<b>成分：</b> PAP〔有機リン系 PRTR・1種〕……………2.0%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm以下 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 広範囲の害虫に有効で、各作物の主要害虫、雑害虫を同時に防除できる。
- 稲に収穫7日前まで使用できるので、稲害虫の総合仕上げ防除に適する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 害虫の発生をみたら早目に散布する。
- ハスモンヨトウの防除は、若齢幼虫期に散布する。
- 小麦のムギアカタマバエの防除は、出穂期から穂揃期にかけて散布する。

### 【安全対策上の注意】……………

- 稲に使用する場合は、散布後少なくとも3日間は落水、かけ流しはしない。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、本剤を桑に散布した場合は15日以上経過してから蚕に給与する。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 魚類に低濃度でも影響を及ぼすので注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用害虫名		10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤及びPAPを含む 農薬の総使用回数	使用 方法
稲	ニカメイチュウ	第1世代	3 kg	7 日前まで	2 回以内	散布
		第2世代	4 kg			
	サンカメイチュウ第3世代		4.5 kg			
	ツマグロヨコバイ、アブラムシ類 ヒメトビウンカ セジロウンカ イネゾウムシ成虫		3～4 kg			
	フタオビコヤガ カメムシ類		4 kg			
	イネハモグリバエ イネヒメハモグリバエ イネドロオイムシ		3 kg			
	ヒメトビウンカ アブラムシ類 ムギアカタマバエ ムギダニ					
小 麦	モモノゴマダラノメイガ		4～6 kg	14 日前まで	2 回以内	
く り			3 kg	30 日前まで	3 回以内	
キ ャ ベ ツ	アオムシ			21 日前まで	2 回以内	
カリフラワー	コナガ			30 日前まで	4 回以内	
ブロッコリー	アブラムシ類			21 日前まで	2 回以内	
は く さ い	ハスモンヨトウ			7 日前まで	2 回以内	
だ い こ ん か ぶ	ハスモンヨトウ			14 日前まで	1 回	
レ タ ス	ヒルガオハモグリガ ハスモンヨトウ ナカジロシタバ			4 kg	最終摘採後 から冬期まで	
か ん し ょ	ハスモンヨトウ		3～4 kg	摘 採 15 日前まで	2 回以内	
ば れ い し ょ さ と い も	ハスモンヨトウ マメシクイガ シロイチモジマダラメイガ		4 kg	—	2 回以内	
だ い ず	チャドクガ		3 kg	—	2 回以内	
茶	コカクモンハマキ		3～5 kg	—	2 回以内	
桑	ヒシモンヨコバイ クワヒメゾウムシ		3～5 kg	—	2 回以内	
た ば こ	ハスモンヨトウ タバコアオムシ		3～5 kg	—	2 回以内	