

スルホキサフロール・カスガマイシン・トリシクラゾール水和剤 ダブルカットエクシードフロアブル	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： ダウ、北興、ダウ
成分：スルホキサフロール〔スルホキシイミン系〕……………10.0% カスガマイシンー塩酸塩〔抗生物質〕……………1.37% （カスガマイシンとして……………1.20%） トリシクラゾール……………8.0%	性状：淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体 毒性：普通物 消防法：——

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用 時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60 ～ 150 ℓ	穂揃期 まで	散布	本剤 2 回以内 スルホキサフロール 3 回以内 カスガマイシン 4 回以内 （種子浸漬は 1 回以内，育苗 箱への処理は 1 回以内，本 田では 2 回以内）
		300 倍	25 ℓ			トリシクラゾール 4 回以内 （育苗箱への処理は 1 回以 内，本田では 3 回以内）
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8 倍	800 ml		無人航空 機による 散布	
		30 倍	3 ℓ		空中散布	