

<b>プロピリスルフロンのプロモブチド・ペントキサゾン剤</b> <b>ドラゴンホークZ</b> <b>(1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)</b>	<b>取扱メーカー：</b> 三井アグロ  <b>原体メーカー：</b> 住友化学，住友化学，科研製薬
<b>成分：</b> プロピリスルフロンの〔スルホニルウレア系〕 ……0.90% (粒剤)，3.0% (ジャンボ)，1.7% (フロアブル) プロモブチド〔酸アミド系〕 ……9.0% (粒剤)，30.0% (ジャンボ)，16.8% (フロアブル) ペントキサゾン〔オキサゾリジンジオン系〕 ……2.0% (粒剤)，6.67% (ジャンボ)，3.7% (フロアブル)	<b>性状：</b> 類白色細粒 (粒剤) 類白色細粒 水溶性バック入り1バック 30g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル)  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】…………… 〈共通〉

- 広範な殺草スペクトラムを持ちSU抵抗性雑草にも効果を示すプロピリスルフロンの，ホタルイやコナギへの効果に定評があるペントキサゾンと，ノビエに安定した効果のプロモブチドを加えた3成分の初・中期一発処理除草剤。
- 高葉齢のノビエ（3葉期）にも効果。
- ホタルイ，コナギ，アゼナなどのSU抵抗性雑草にも効果。
- 多年生難除雑草クログワイにも高い効果。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5．水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので，ノビエの3葉期までに，時期を失ないように散布する。多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので，必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	3葉期まで		
ミズガヤツリ	3葉期まで	4葉期まで	
ヒルムシロ	発生期まで		
エノノサマカガサ	発生始期まで	—	発生始期まで
オモダカ クログワイ コウキヤガラ	発生始期まで		
シズイ	草丈3cmまで		
セリ	再生前～再生始期まで		
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前まで		

### 【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5．水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ，れんこん，せり，くわい，など）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用をさける。
- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので，物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用する。
- オモダカ，クログワイ，コウキヤガラ，シズイは発生期間が長く，遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので，必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
- いぐさ栽培予定水田では使用しない。
- 使用量，使用時期，使用方法などを誤らないように注意し，特に初めて使用する場合や異常気象時は，病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めする。

#### 〈ジャンボ〉

- 藻類又は表層はく離の発生しやすい水田では，有効な剤との組み合わせで使用する。
- 処理は，水の出入りを止めて5～6cmの湛水状態に保つ。
- 小包装（バック）のまま，10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

【安全対策上の注意】 .....

〈共通〉

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

〈粒剤・フロアブル〉

●無人航空機散布の際は，共通注意事項の2．空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】 .....

①ドラゴンホークZ 1キログラム粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg	田植同時散布機で 施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布 又は 無人航空機による 散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで			

※プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

## ②ドラゴンホーク Z ジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類によ る表層はく離	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g)	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類によ る表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで			

※プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

### ③ ドラゴンホーク Z フロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布、 水口施用 又は 無人航空機による 滴下	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布 又は 無人航空機による 滴下	

※プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内