

プロメトリン・ベンチオカーブ乳剤 サターンバアロ乳剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： シンジェンタ、クミカ
成分： プロメトリン〔トリアジン系〕……………5.0% ベンチオカーブ〔カーバメート系 PRTR・1種〕……………50.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕……………12%〈11～13%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………24%〈23～25%〉	性状： 淡黄色可乳化液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- サターンバアロ粒剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- サターンバアロ粒剤の項参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- はとむぎに使用する場合は直播栽培で使用する。
- 直播水稲に使用する場合は下記に注意する。
 - 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
 - 落水後全面土壌散布の場合は落水を完全に行った後散布する。また、出芽直前に散布し帯

水する場合は薬害の危険性があるので、降雨が予想される場合には、は種後早い時期に散布する。

○稲出芽前に入水を行うと薬害を生じるおそれがあるので、出芽前に入水はさける。

- 適用作物（全般）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

- 適用外作物（隣接作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 自動車などにかからないようにする。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 藻類に影響を及ぼすので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用 方法	本剤の 使用回数	プロメトリン を含む農薬の 総使用回数	ベンチオカーブ を含む農薬 の総使用回数
			薬量	希釈水量				
直播水稲	一年生雑草 マツバイ	は種直後～ 稲出芽前 (ノビエ 1 葉期まで) (入水 15 日前まで)	600 ～ 800 ml	70 ～ 100 ℓ	乾田・ 落水状 態で全 面土壌 散布	1 回	1 回	2 回以内 (入水前は 1 回以内、 入水後は 1 回以内)
はとむぎ	一年生雑草	は種直後 (雑草発生前)	500 ml		全面土 壌散布		2 回以内	1 回
にんじん			600 ～ 1000 ml				1 回	
とうもろこし		は種後出芽前	800 ～ 1000 ml				2 回以内	
らっかせい			600 ～ 800 ml				1 回	
いんげんまめ だ い ず			600 ～ 1000 ml				2 回以内	
麦 類			は種直後～ 麦出芽前				500 ～ 750 ml	