

レピメクチン乳剤 アニキ乳剤	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ
成分： レピメクチン〔マクロライド系〕……………1.0%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類（水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 速効性に優れた野菜・果樹・茶用のマクロライド系殺虫剤である。
- 他剤の効きににくくなったコナガを含むチョウ目害虫を中心に、幅広い殺虫スペクトラムを有する。
- ハチ類への影響が小さい（ミツバチ、マルハナバチに対する影響日数は1日）。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、桑葉にかからないように注意する。
- マルハナバチに影響を与える場合があるので、巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。

●共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

●誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。

●眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。

●甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意する

●危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意する。

●火気をさけ保管する。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数
み か ん	チャノキイロアザミウマ	1000～ 4000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	4回以内	散布	4回以内
	ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍					
	ミカンサビダニ	2000～ 4000倍					
	アゲハ類	1000～ 4000倍					
	チャノホコリダニ	4000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数		
かんきつ (みかん を除く)	チャノキイロアザミウマ	1000～ 4000倍	200～ 700 ℓ	3日前 まで	4回以内	散布	4回以内		
	ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍							
	ミカンサビダニ	2000～ 4000倍							
	アゲハ類	1000～ 4000倍							
	チャノホコリダニ	4000倍							
だ い ず えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～ 3000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3回以内		3回以内		
さといも		2000倍							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～ 3000倍						4回以内	4回以内
豆 類 (未成熟、 但し、えだまめ、 さやえんどう を除く)	ハスモンヨトウ	2000倍							
メ ロ ン	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍			3回以内	3回以内			
	す い か	オオタバコガ コナジラミ類					1000倍		
アスパラガス	ハスモンヨトウ	2000倍							
い ち ご	オオタバコガ	1000～ 2000倍							
	ト マ ト ミニトマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ					2000倍		
ハスモンヨトウ コナジラミ類		1000～ 2000倍							
な す		オオタバコガ ハモグリバエ類 チャノホコリダニ					2000倍		
		コナジラミ類						1000～ 2000倍	
	ピーマン とうがらし類	ハスモンヨトウ オオタバコガ チャノホコリダニ					2000倍		
コナジラミ類		1000倍							
きゅうり		コナジラミ類	1000倍						
	ほうれんそう セルリー	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍						
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数
非結球あぶらな科 葉 菜 類	コナガ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ ハモグリバエ類	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ			3日前 まで			
キ ャ ベ ツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ			2000倍			
	シロイチモジヨトウ	2000倍					
は く さい	キスジノミハムシ	1000倍					
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ カブラハバチ	1000～ 2000倍					
	ブロッコリー			コナガ ハスモンヨトウ アオムシ			
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍					
ね ぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ	1000～ 2000倍					
	ネギアザミウマ ハモグリバエ類	1000倍					
た ま ね ぎ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000倍	前日まで				
だ い こ ん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	1000～ 2000倍	3日前 まで				
か ぶ	コナガ	1000倍	前日まで				
	キスジノミハムシ	2000倍					
未成熟とうもろこし ヤングコーン	オオタバコガ	1000倍					
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (しそを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍					
し そ	ハスモンヨトウ シソサビダニ						
食用金魚草 食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこ 食用トレニア 食用パンジー	ハスモンヨトウ						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数	
食用ぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
きく（葉）				3 日前 まで				
茶	チャノコカクモンハマキ	1000～ 2000 倍	200～ 400 ℓ	摘採 7 日 前まで	2 回以内		2 回以内	
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ		100～ 300 ℓ	発生初期	6 回以内		6 回以内	
	マメハモグリバエ	1000 倍						
カーネーション	オオタバコガ	1000～						
ストック	コナガ	2000 倍						
りんどう	リンドウホソハマキ	2000 倍						