

フェンプロパトリン乳剤 ロディー乳剤	取扱メーカー： 北興、住友化学、一農、琉産 原体メーカー： 住友化学
成分： フェンプロパトリン〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕…10.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕……………42%以下 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………41%以下	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 劇物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- 作用機作，特性はロディー水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ロディー水和剤の項参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ミカンハダニに対する残効は短い傾向があるので留意する。
- ロディー水和剤の項参照。
- 共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- のど，鼻，皮膚などを刺激する場合，また，カユミを生じる場合があるので注意する。
- 摘果等の作業の際は，農業用マスク，手袋，長ズボン・長袖の作業衣を着用する。
- 自動車，壁などの塗装面，大理石，御影石などにかからないよう注意する。
- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを 含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類 ケシキスイ類 ミカンハダニ コアオハナムグリ ミドリヒメヨコバイ シャクトリムシ類 ハマキムシ類 カネタタキ ケムシ類	2000倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	4回以内	散布	9回以内 (噴射は5回 以内、散布及 びくん煙は合 計4回以内)
	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ	1000～ 2000倍		前日まで	5回以内		10回以内 (噴射は5回 以内、散布は 5回以内)
もも	アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ	2000倍					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	1000倍		14日前 まで	2回以内		7回以内 (噴射は5回 以内、散布は 2回以内)
あずき	ハダニ類						
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	7日前まで	3回以内		3回以内
すいか メロン	アブラムシ類 ハダニ類			前日まで	5回以内		5回以内
	かぼちゃ				アブラムシ類		4回以内
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ			3日前まで	3回以内		3回以内
	なす			アブラムシ類 ハダニ類 オンシツコナジラミ	前日まで		5回以内
ピーマン	アブラムシ類 ハダニ類	3回以内		3回以内			
ししとう	ハダニ類						
いちご	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 2000倍					
茶	チャトゲコナジラミ	1000倍	—	挿し木前	1回	3分間挿 し穂浸漬	1回
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャトゲコナジラミ	1000～ 2000倍	200～ 400 ℓ	摘採7日 前まで		散布	
	チャハマキ ヨモギエダシャク ツマグロアオカスミカメ	1000倍					
	花き類・ 観葉植物						