

シプロジニル・フルジオキサニル水和剤 スイッチ顆粒水和剤	取扱メーカー： シンジェンタ 原体メーカー： シンジェンタ, シンジェンタ
成分： シプロジニル〔アニリノピリミジン系〕……………37.5% フルジオキサニル〔フェニルピロール系〕……………25.0%	性状： 淡褐色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 作用性の全く異なる成分の混合剤で、予防効果と治療効果が期待できる。
- ワックス層への親和性が高く、耐雨性と残効性に優れる。
- 既存の薬剤耐性菌にも高い効果がある。
- 顆粒水和剤で、計量がしやすく粉立ちも少ないため薬液調製が簡単。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 灰色かび病防除に使用する場合には、開花期から落花期（落弁期）に1～2回散布する。
- 過度の連用はさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用する。
- ぶどうの晚腐病に対して、多発生が予想される場合には所定範囲で高濃度散布をする。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（レタス、おうとう）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調整する。
- 繰り返し使用する場合には、散布間隔を7日以上あける。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に影響を及ぼすおそれがあるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シプロジニルを含む 農薬の総使用回数	フルジオキシニルを含む 農薬の総使用回数
み か ん	灰色かび病 (みかんを除く)	2000～ 3000 倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
かんきつ (みかんを除く)				45日前 まで	2回以内		2回以内	2回以内
ぶ ど う				30日前 まで				3回以内
う め	灰色かび病 黒星病	3000 倍		45日前 まで				2回以内
たまねぎ	灰色かび病	1000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3回以内		3回以内	4回以内 (定植前は 1回以内、 定植後は3 回以内)