

<b>PAP水和剤</b> <b>エルサン水和剤40</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産  <b>原体メーカー：</b> 日産
<b>成分：</b> PAP〔有機リン系 PRTR・1種〕……………40.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ベンゼン〔PRTR・1種〕……………0.22%	<b>性状：</b> 類白色水和性粉末 <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- エルサンの果樹，野菜用剤で広範囲の害虫を併殺防除できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液や石灰硫黄合剤などのアルカリ性薬剤との混用はさけるか，散布直前に混合する。
- 適用作物（りんご・旭・赤色系，かき）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（ぶどう，さといも，いちご，うり類，れんこん，うめ，もも，ソルゴー）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	PAPを含む農 薬の総使用回数						
りんご	クワコナカイガラムシ モモシンクイガ ハマキムシ類 マイマイガ幼虫 モモチョッキリゾウムシ カメムシ類	1000倍	200～ 700 ℓ	45日前まで	2回以内	散布	2回以内 (樹幹散 布は1回 以内)						
なし	クワコナカイガラムシ アブラムシ類 シンクイムシ類 ナシキジラミ カメムシ類	800～ 1000倍		60日前まで			2回以内	散布	2回以内				
	ハマキムシ類 ナシミハバチ												
みかん	ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ アカマルカイガラムシ ハマキムシ類 ミカンハモグリガ ミカンコナジラミ アブラムシ類	800倍		14日前まで						2回以内	散布	2回以内	
キャベツ カリフラワー	アオムシ コナガ	800～ 1000倍		100～ 300 ℓ									30日前まで
ブロッコリー			21日前まで		2回以内	2回以内							
はくさい													
だいこん かぶ													
かき	コナカイガラムシ類 カメムシ類 アザミウマ類 カキノヘタムシガ	800倍	200～ 700 ℓ	30日前まで			4回以内	4回以内					