

スルホキサフロル水和剤 ビレスコ顆粒水和剤	取扱メーカー： 日産 [*] ，北興 [*] ，ダウ [*] 原体メーカー： ダウ
成分： スルホキサフロル〔スルホキシイミン系〕……………25.0% その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム〔PRTR・I 種〕……………1.5%	性状： 類白色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 新規の「スルホキシイミン系」殺虫剤。
- 幅広い種類のアブラムシ類に対して，卓効を示す。
- 速効性があり，散布後すぐに「ストレッチ症状」を引き起こし，吸汁害虫をストップさせる。
- 浸透移行性及浸達性により葉裏や茎葉にも成分が及ぶため，残効性に優れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 本剤の所要量を所定量の水にうすめ，よくかき混ぜてから散布する。
- 散布量は対象作物の生育段階，栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ばれいしょに対して希釈倍数1250倍で散布する場合は，少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度運動式地上液剤散布装置を使用する。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	スルホキサフロルを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	5000～ 10000倍	100～ 300ℓ	収穫 7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		1250倍	25ℓ				
てんさい		5000～ 10000倍	100～ 300ℓ				