

イミダクロプリド・クロラントラニプロール・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤 エバーゴルワイド箱粒剤	取扱メーカー： バイエル 原体メーカー： バイエル、FMC、 住友化学・バイエル、バイエル
成分：イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0% ベンフルフェン〔アルキルアミド系〕……………2.0%	性状：類白色細粒 毒性：普通物 消防法：——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) もみ枯細菌病	50g	移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 イミダクロプリド 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内) クロラントラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内) ベンフルフェン 1回
	穂枯れ (ごま葉枯病菌) 白葉枯病 内穎褐変病		は種時 (覆土前) ～移植当日		
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病		は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する。	

* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ