

<p>チウラム水和剤</p> <p>トレノックスフロアブル</p>	<p>取扱メーカー： 協友アグリ</p> <p>原体メーカー： 大内新興</p>
<p>成分：チウラム〔有機硫黄系 PRTR・1 種〕……………40.0%</p>	<p>性状：類白色水和性と粘稠懸濁液体</p> <p>毒性：普通物</p> <p>消防法：——</p>

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	チウラムを含む 農薬の総使用回数
も も	黒星病 灰星病	500 倍	200 ～ 700 ℓ	7 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内
ネクタリン	縮葉病 せん孔細菌病			30 日前まで	2 回以内		2 回以内 (休眠期は 1 回以内)
か き	落葉病 炭疽病 うどんこ病						3 回以内
す も も	ふくろみ病 炭疽病			14 日前まで	3 回以内		3 回以内
あ ん ず	かいよう病			21 日前まで	2 回以内		2 回以内
う め	黒星病				5 回以内		5 回以内 (萌芽後は 2 回以内)
おうとう	褐色せん孔病 炭疽病 灰星病 幼果菌核病	1000 倍		60 日前まで	2 回以内		3 回以内 (休眠期は 1 回以内, 生育期は 2 回以内)
ぶ ど う	晩腐病 べと病 灰色かび病 褐斑病 黒とう病						7 回以内 (育苗期は 5 回以内, 生育期は 2 回以内)
い ち ご	炭疽病						6 回以内
りんどう	褐斑病 葉枯病 炭疽病 灰色かび病	500 倍	100 ～ 500 ℓ	発病初期	6 回以内		6 回以内
花 き 類・ 観葉植物 (りんどう を除く)	灰色かび病 炭疽病						