

| | |
|--|---|
| アセタミプリド水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤 | 取扱メーカー： 日農、日本曹達 原体メーカー： 日本曹達 |
| 成分： アセタミプリド〔ネオニコチノイド系〕……………20.0% その他 PRTR 該当成分： 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム〔PRTR・1種〕…2.4% | 性状： 青色水溶性細粒及び微粒 毒性： 劇物 消防法： —— |

【品目特性】……………

- 有機リン剤・カーバメート剤・合成ピレスロイド剤などに効きにくくなった害虫に有効である。
- 幅広い殺虫スペクトルを有する。
- 高い活性があり、少ない薬量で長い残効性がある。
- 速効性と強い浸透移行性を併せ持つ薬剤である。
- ミツバチ・マルハナバチに影響が少ない。
- 顆粒タイプの剤型で、計量が簡単にできる。
- 登録作物が幅広い。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- なしに使用する場合、品種により葉に黒変の薬害を生じることがあるので注意する。

○薬害が認められた事例がある品種

長十郎、新高、八雲及び愛甘水

○薬害が認められていない品種

二十世紀、新水、幸水、豊水、新星、ゴールド

二十世紀、新興、晩三吉、愛宕、新雪、今村秋、

新世紀、豊月、秋甘泉、新甘泉、なつひめ、あ

きづき、涼月、夏さやか、おさゴールド、王秋、

秋栄、筑水、八里、多摩、南水、越後錦、秋水、

長寿、幸菊、ラ・フランス、ル・レクチエ、マ

グリット、ヤーリー

●ぶどうに対しては幼果期から果実肥大期の散布は果粉の溶脱のおそれがあるので使用はさけ、新梢伸長期から落花期及び袋かけ以降に使用する。

●メロン、うり科作物に対しては葉縁に薬害を生じるおそれがあるので、使用濃度、使用量を厳守し、幼苗期や高温時の使用をさける。

●かんきつに対して希釈倍率200～400倍で使用する場合、薬液が葉にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布する。

●共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

●共通注意事項6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。

●眼に対して刺激性がある。



【適用と使用法】

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 |
|--------|---|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| かんきつ | アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 カイガラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 コアオハナムグリ ケシキスイ類 アゲハ類 カメムシ類 ミカンバエ | 2000～ 4000倍 | 200～ 700ℓ | 14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | コナジラミ類 | 4000倍 | | | | 主幹から 株元に散布 | |
| | ゴマダラカミキリ | 200～ 400倍 | 30～ 75ℓ | | | | |
| りんご | アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ シンクイムシ類 カメムシ類 リンゴワタムシ | 2000～ 4000倍 | 200～ 700ℓ | 前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | カイガラムシ類 モモチョッキリゾウムシ コガネムシ類成虫 | 4000倍 | | | | | |
| | ケムシ類 キリガ類 | 2000倍 | | | | | |
| なし | カメムシ類 アブラムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類 カキノヒメヨコバイ | 2000～ 4000倍 | 200～ 700ℓ | 前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | ナシホソガ | 4000倍 | | | | | |
| もも | アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 コガネムシ類成虫 モモチョッキリゾウムシ | 2000～ 4000倍 | 200～ 700ℓ | 3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | コスカシバ カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | | | | | |
| ネクターリン | アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 コガネムシ類成虫 モモチョッキリゾウムシ | 4000倍 | | 3日前まで | | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------|------------------------|-----|--------|--------|------|--------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|-------|------|------|--------|------|-----|------|------|
| ぶ ど う | カイガラムシ類 アザミウマ類 フタテンヒメヨコバイ コガネムシ類成虫 | 2000～ 4000 倍 | 200～ 700 ℓ | 14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ツマグロアオカスカメ トビイロトラガ | 2000 倍 | | 収穫後 秋期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブドウトラカミキリ | | | 前日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| か き | アザミウマ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ | 2000～ 4000 倍 | | 14日前まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| か き（葉） | カキノヒメヨコバイ カメムシ類 | 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小粒核果類 (うめ, すももを除く) | アブラムシ類 | 2000～ 4000 倍 | | 前日まで | 1 回 | | 3回以内 | 1 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| う め | アブラムシ類 | 2000～ 6000 倍 | | | | | | | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ケシクスイ類 ノコメトガリキリガ カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| す も も | カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ | | | | | | | | | | | 14日前まで | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アブラムシ類 シンクイムシ類 | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| お う と う | カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | 3回以内 | 7日前まで | 1 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カメムシ類 オウトウショウジョウバエ | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アザミウマ類 | 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| び わ | アブラムシ類 カミキリムシ類 | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | 1 回 | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | |
| | カイガラムシ類 ビワキジラミ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いちじく | アザミウマ類 キボシカミキリ カイガラムシ類 イチジクヒトリモドキ | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | |
| | ナシヒメシンクイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| か り ん | アブラムシ類 | 4000 倍 | | 35日前まで | 3回以内 | | 7日前まで | 1 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あ け び （ 果 実 ） | アブラムシ類 | 4000 倍 | | | | | | | 21日前まで | 45日前まで | 前日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 回 | | | | | | | | |
| | アザミウマ類 カイガラムシ類 | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | |
| マンゴー | カイガラムシ類 | 2000 倍 | | | | | | | | | | 7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | 21日前まで | | | | | | | | | | | | | | | | | 45日前まで | 前日まで | 1 回 | | |
| | カメムシ類 | 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴレンシ | センノカミキリ | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | | | | | | | | | | | | | | | | 2回以内 | 2回以内 |
| たらのき | オウトウショウジョウバエ | 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブルーベリー | アブラムシ類 | | 7日前まで | | | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アセロラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|
| パッションフルーツ | カイガラムシ類 | 2000 倍 | 200 ～ 700 ℓ | 30 日前まで | 2 回以内 | 散布 | 2 回以内 |
| オ リ ー ブ | カメムシ類 | | | | 1 回 | | 1 回 |
| く り | アブラムシ類 カイガラムシ類 | 4000 倍 | | 7 日前まで | 3 回以内 | | 3 回以内 (樹幹注入は 1 回 以内) |
| | クリシギゾウムシ クリミガ | 2000 ～ 4000 倍 | | | | | |
| | モモノゴマダラノメイガ | 2000 倍 | | | | | |
| 食用さくら (葉) | アザミウマ類 | 4000 倍 | 3 日前まで | 1 回 | 1 回 | | |
| さんしょう (葉) | アブラムシ類 アザミウマ類 | | 45 日前まで | 6 回以内 | 6 回以内 | | |
| さんしょう (果実) | ゴマダラカミキ リ幼虫 | 200 倍 | 20 ℓ | 1 回 | 4 回以内 | 樹幹散布 (散布は 1 回以内、 樹幹散布は 3 回 以内) | |
| | | | | 7 日前まで | 3 回以内 | | |
| 麦 類 | アブラムシ類 | 4000 倍 | 60 ～ 150 ℓ | 2 回以内 | | 2 回以内 | |
| とうもろこし (子実) | | 2000 ～ 4000 倍 | 14 日前まで | 3 回以内 | 3 回以内 | | |
| 未成熟とう も ろ こ し | | 2000 倍 | 前日まで | 2 回以内 | 2 回以内 | | |
| ヤングコーン | | | | | | | |
| ばれいしょ | ジャガイモガ | 2000 ～ 4000 倍 | 7 日前まで | 3 回以内 | 4 回以内 (植付時の土壌混 和は 1 回以内、植 付後は 3 回以内) | | |
| | テントウムシダマシ類 | 2000 ～ 4000 倍 | | | | | |
| | アブラムシ類 | 2000 ～ 6000 倍 | | | | | |
| かんしょ | アブラムシ類 アザミウマ類 ナガイモコガ | 4000 倍 | 100 ～ 300 ℓ | 前日まで | 3 回以内 | | |
| やまのいも | | | | 7 日前まで | 3 回以内 | | |
| やまのいも (種芋栽培) | | | | 種芋掘取り 7 日前まで | 5 回以内 | 5 回以内 | |
| やまのいも (むかご) | | | | 21 日前まで | 散布 | 3 回以内 (は種時又は定植 時の土壌混和は 合計 1 回以内、 散布は 3 回以内) | |
| 豆 類 (未成熟、但し、 えだまめ、 さやいんげん、 さやえんどう を除く) | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 7 日前まで | | | | | |
| えだまめ | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 フタスジヒメハムシ マメシロイガ | 2000 ～ 4000 倍 | 前日まで | | | | 3 回以内 |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 2000 ～ 4000 倍 | | | 3 回以内 | | |
| | コナジラミ類 アザミウマ類 | 4000 倍 | | | | | |
| さやえんどう | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | | | | | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------|--|--|--|
| 豆 類 (種実, 但し, だいずを除く) | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 2000～ 4000 倍 | 100～ 300 ℓ | 14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | |
| だ い ず | アブラムシ類 マメシクイガ コナジラミ類 アザミウマ類 フタスジヒメハムシ | | | | | | | | |
| き ゅ う り | コナジラミ類 ウリノメイガ | 2000 倍 | | 前日まで | | | 3回以内 | 5回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内, 2% 粒剤の定植後 の株元散布は1回 以内, 散布, くん煙 及び1% 粒剤の株 元散布は合計3回 以内) | |
| | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | |
| | ウリハムシ | 4000 倍 | | | | | | | |
| す い か | コナジラミ類 ウリノメイガ | 2000 倍 | | 3日前まで | | | 3回以内 | 4回以内 (粒剤の定植時ま での処理は1回以 内, 散布, くん煙及 び定植後の株元散 布は合計3回以内) | |
| | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | |
| | ウリハムシ | 4000 倍 | | | | | | | |
| う り 類 (漬物用) | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000～ 4000 倍 | | 前日まで | 2回以内 | | 3回以内 | | |
| か ぼ ち や | アブラムシ類 | | | | | | 3回以内 (粒剤の定植時ま での処理は1回以 内, 散布及び定植 後の株元散布は合 計2回以内) | | |
| | カボチャミバエ | 2000 倍 | | | | | | | |
| | ウリハムシ | 4000 倍 | | | | | | | |
| メ ロ ン | | 8000 倍 | | 3日前まで | 3回以内 | | 3回以内 | | |
| に が う り | アブラムシ類 | 4000 倍 | | 前日まで | 3回以内 | | 2回以内 | | |
| まくわうり | ウリハムシ | | | | | | 2回以内 | | |
| ト マ ト ミニトマト | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 2000 倍 | | | | | 前日まで | 3回以内 | 4回以内 (粒剤の定植時ま での処理は1回以 内, 散布, くん煙及 び定植後の株元散 布は合計3回以内) |
| な す | アブラムシ類 テントウムシダマシ類 | 4000 倍 | | | | | | | |
| | コナジラミ類 | 2000 倍 | | | | | | | |
| | アザミウマ類 | 2000～ 4000 倍 | | | | | | | |
| ピーマン | アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 | 4000 倍 | | | 2回以内 | | 3回以内 (粒剤の定植時ま での処理は1回以 内, 散布, くん煙及 び定植後の株元散 布は合計2回以内) | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含む農薬の総使用回数 | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------|--|--|
| とうがらし類 (ししとうを除く) | アブラムシ類 | 8000 倍 | 100 ～ 300 ℓ | 前日まで | 2 回以内 | 散布 | 2 回以内 (定植時の土壌混和 は 1 回以内) | |
| し し と う | | | | | | | 3 回以内 (定植時の土壌混和 は 1 回以内, 散布 は 2 回以内) | |
| キ ャ ベ ツ | コナガ アオムシ | 1000 ～ 2000 倍 | | 7 日前まで | 5 回以内 | | 6 回以内 (粒剤の定植時ま での処理は 1 回以内, 散布及び定植後の 株元散布は合計 5 回以内) | |
| | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000 ～ 4000 倍 | | | | | 4 回以内 (粒剤の定植時ま での処理は 1 回以内, 散布は 3 回以内) | |
| カリフラワー | コナガ アオムシ アブラムシ類 | 2000 倍 | | 14 日前まで | 3 回以内 | | 4 回以内 (粒剤の定植時ま での処理は 1 回以 内, 散布及び定 植後の株元散布 は合計 3 回以内) | |
| ブロッコリー | コナガ アオムシ アブラムシ類 アザミウマ類 | | | | | | 4 回以内 (粒剤の定植時ま での処理は 1 回以 内, 散布及び定 植後の株元散布 は合計 3 回以内) | |
| 茎ブロッコリー | アブラムシ類 | 4000 倍 | | 前日まで | 2 回以内 | | 2 回以内 | |
| は く さ い | コナガ アオムシ | 1000 ～ 2000 倍 | | 14 日前まで | 3 回以内 | | 4 回以内 (粒剤の定植時ま での処理は 1 回以 内, 散布及び定 植後の株元散布 は合計 3 回以内) | |
| | アブラムシ類 | 2000 ～ 4000 倍 | | | | | 1 回 | |
| | カブラハバチ | 4000 倍 | | | | | | |
| だ い こ ん | コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ | 2000 倍 | | 7 日前まで | 1 回 | | | 2 回以内 (粒剤の処理は 1 回 以内, 散布は 1 回 以内) |
| | カブラハバチ アブラムシ類 | 2000 ～ 4000 倍 | | | | | | |
| はつかだいこん | アブラムシ類 | 2000 倍 | | | | | | |
| わさびだいこん | コナガ | | | 4000 倍 | | | | |
| か ぶ | キスジノミハムシ アブラムシ類 カブラハバチ | | | | 7 日前まで | | | |
| な ば な 類 | アブラムシ類 キスジノミハムシ カブラハバチ | 4000 倍 | | | 21 日前まで | | | |
| 非結球あぶら な 科 葉 菜 類 (チンゲンサイ を 除 く) | | | | 14 日前まで | | | | |
| チンゲンサイ | | | | 7 日前まで | | | | |
| ザ ー サ イ | アブラムシ類 キスジノミハムシ | | | | | | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 非結球メキャベツ | アブラムシ類 | 2000 倍 | 100～ 300 ℓ | 7 日前まで | 2 回以内 | 散布 | 3 回以内 (土壌混和は 1 回以内, 散布は 2 回以内) | | | | | | | | | |
| メキャベツ | | | | | 1 回 | | 1 回 | | | | | | | | | |
| い ち ご | アブラムシ類 | 2000～ 4000 倍 | | 前日まで | 2 回以内 | | 3 回以内 (粒剤の株元散布 及び土壌混和は合 計 1 回以内, 散布 及びくん煙は合計 2 回以内) | | | | | | | | | |
| | コナジラミ類 アザミウマ類 | 2000 倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| | カキノヒメヨコバイ | 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| つ る な レモンバーム | アブラムシ類 | 4000～ 8000 倍 | | 14 日前まで | 3 回以内 | | 3 回以内 | | | | | | | | | |
| セ ー ジ | | | | 21 日前まで | | | | | | | | | | | | |
| バ ジ ル タ イ ム | | 14 日前まで | | | | | | | | | | | | | | |
| マジョラム オ レ ガ ノ は つ か パ セ リ た ま ね ぎ | | 7 日前まで | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 日前まで | | 1 回 | 1 回 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ね ぎ | アザミウマ類 | 2000 倍 | | 7 日前まで | 3 回以内 | | 3 回以内 (は種時の土壌混和 は 1 回以内, 植付時 の土壌混和及び定植 当日までの株元散布 は合計 1 回以内) | | | | | | | | | |
| わ け ぎ あ さ つ き | | | | | | | 4 回以内 (土壌混和は 1 回以 内, 散布は 3 回以内) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 回以内 | | | | | | | | | |
| に ら | アブラムシ類 アザミウマ類 | 4000 倍 | | 前日まで | 2 回以内 | | 2 回以内 | | | | | | | | | |
| らつきよう | 2000 倍 | 14 日前まで | | | | | | | | | | | | | | |
| に に に く | アザミウマ類 | 2000～ 4000 倍 | | 前日まで | | | | | | | | | | | | |
| | ネギコガ | 4000 倍 | | | | | | | | | | | | | | |
| アスパラガス | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ジュウホシクビナガハムシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ト レ ビ ス | アブラムシ類 | 2000 倍 | | 1 回 | 1 回 | | | | | | | | | | | |
| レ タ ス | アブラムシ類 ナモグリバエ | 2000～ 4000 倍 | | | 3 回以内 | | 4 回以内 (粒剤の株元散布は 1 回以内, 散布は 3 回以内) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 回以内 (粒剤の株元散布は 1 回以内, 散布は 1 回以内) | | | | | | | | | |
| 非結球レタス | アブラムシ類 アザミウマ類 ナモグリバエ | 4000 倍 | | 7 日前まで | 1 回 | | 2 回以内 (粒剤の株元散布は 1 回以内, 散布は 1 回以内) | | | | | | | | | |
| おかひじき | アブラムシ類 | | | | 2 回以内 | | 2 回以内 | | | | | | | | | |
| オ ク ラ | | | | | 3 回以内 | 3 回以内 | | | | | | | | | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 |
|--|----------------------------|-----------------|---|--|-------------|--------|---|
| 食 用 ギ く | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000 倍 | 100 ～ 300 ℓ | 14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 食 用 ゆ り | アブラムシ類 | 4000 倍 | | 前日 まで | 4回以内 | | 4回以内 |
| しょうようほおずき | | 14日前まで | | 3回以内 | 3回以内 | | |
| 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー 食用なでしこ | アブラムシ類 | 8000 倍 | | 14日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| 食用金魚草 食用プリムラ | | | | | 1 回 | | 1 回 |
| 食用ミニバラ | | 4000 倍 | | 3日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| て ん さ い | テンサイトビハムシ テンサイモグリハナバエ | 200 倍 | ペーパー ポット 1 冊当り 1 ℓ (3 ℓ /m ²) | 定植前 | 1 回 | 苗床灌注 | 3回以内 (苗床灌注は 1回以内) |
| み つ ば | アブラムシ類 | 8000 倍 | 100 ～ 300 ℓ | 7日前まで 但し、伏せ 込み栽培は 伏せ込み前 まで | 散布 | 1 回 | |
| ほうれんそう しゅんぎく | | 14日前まで 3日前まで | | 2回以内 | | 2回以内 | |
| くきちしゃ ふだんそう エンサイ | | 7日前まで | | | | | |
| し そ しそ(花穂) | | | | | | | |
| ふ き | コナジラミ類 | 3000 倍 | | 14日前まで | | 1 回 | 3回以内 (粒剤の株元散布 は1回以内、散布 及びくん煙は合計 2回以内) |
| な ず な ははこぐさ | アブラムシ類 | 8000 倍 | | | | | 1 回 |
| セルリー | アブラムシ類 ナモグリバエ アザミウマ類 | 4000 倍 | | 7日前まで | | 2回以内 | 2回以内 (定植時の土壌混和 は1回以内) |
| チャービル ディル(葉) | アブラムシ類 | 8000 倍 | | 21日前まで | | 3回以内 | 3回以内 |
| タラゴン | | 4000 倍 | | 14日前まで 21日前まで | | 2回以内 | 2回以内 |
| モロヘイヤ | コナジラミ類 | | | 8000 倍 | | 3日前まで | 1 回 |
| アマランサス (荳 葉) | アブラムシ類 シロオビノメイガ | | | | | 21日前まで | 2回以内 |
| なん て ん (葉) | アザミウマ類 | 4000 倍 | | 前日 まで | | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん あしたば | アブラムシ類 | | | 3日前まで | | | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数 | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------|--------------------------|---------------------------|
| さ る な し | クワシロカイガラムシ | 2000 倍 | 200～ 700 ℓ | 7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| な た ね | アブラムシ類 | 4000 倍 | 100～ 300 ℓ | 45日前まで | 1 回 | | 1 回 | |
| び や く し | アゲハ類 | 2000～ | 100～ 300 ℓ | 発生初期 | 5回以内 | | 5回以内 | |
| お け ら | アブラムシ類 | 4000 倍 | | | | | | |
| と う き | | 2000 倍 | | | | | | |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ | 4000 倍 | 200～ 400 ℓ | 摘採 7日前まで | 1 回 | | 1 回 | |
| ソ ル ガ ム | アブラムシ類 | 6000 倍 | 100～ 300 ℓ | 45日前まで | 3回以内 | | 3回以内 | |
| 飼料用とうもろこし まめ科牧草 | | | | 90日前まで | | | | |
| いね科牧草 | | | | 30日前まで | | | | |
| 花 き 類・ 観 葉 植 物 (ストック、 りんどう を除く) | 2000～ 4000 倍 | 発生初期 | | 5回以内 | 5回以内 | | 5回以内 | |
| り ん ど う | アブラムシ類 | | 2000～ 4000 倍 | | | | | |
| | アザミウマ類 | | 2000 倍 | | | | | |
| ス ト ッ ク | アブラムシ類 | | 2000～ 4000 倍 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 樹 木 類 (まつ、やなぎ、 さくらを除く) | グンバイムシ類 | | 2000 倍 | | | | 200～ 700 ℓ | 5回以内 (樹幹注入は 1 回 以内) |
| ま つ | アブラムシ類 | | 4000 倍 | | | | | |
| | グンバイムシ類 | | 2000 倍 | | | | | |
| や な ぎ | ヤナギコハモグリ | | 2000～ 4000 倍 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| さ く ら | グンバイムシ類 クビアカツヤカミキリ | | 2000 倍 | | | | | |
| た ば こ | アブラムシ類 | 2000～ 4000 倍 | 25～ 180 ℓ | 10日前まで | 2回以内 | | 3回以内 (定植後は 2 回 以内) | |