

<b>クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド粉剤 ブラシダントツH粉剤 DL</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学，住友化学，住友化学
<b>成分：</b> クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………0.50% フェリムゾン〔PRTR・1種〕……………2.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………1.5%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用法】** ……………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ カメムシ類	3～4 kg	7日前まで	散布	本剤 2回以内 クロチアニジン 4回以内 （直播での種時又は移植時 までの処理は1回以内，本 田での散布，空中散布，無 人へり散布は合計3回以内） フェリムゾン 2回以内 フサライド 3回以内