トルプロカルブ粒剤 ゴウケツ 1 キロ粒剤	取扱メーカー: 北興 原体メーカー: 三井アグロ
成分:トルプロカルブ [MBI-P]9.0%	性状:類白色細粒 毒性:普通物 消防法: ——

- ●ゴウケツ粒剤の項参照。
- ●無人へり散布でも使用できる。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

●ゴウケツ粒剤の項を参照。

- ●散布に当っては、湛水状態(水深3cm 程度) で重複をさけ均一に散布し、散布後少なくとも4 ~5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、 かけ流しはしない。
- ●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空 よる散布・滴下に関する注意事項を参照。

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルプロカルブを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病	l kg	出穂5日前まで 但し, 収穫30日前まで	1 🗉	湛水散布 無人航空機 による散布	2回以内 (移植時までの処 理は1回以内, 本田での湛水散 布,無人放空機 散布,投げ入れ は合計1回以内)