

チオファネートメチルペースト剤 トップジン M オイルペースト	取扱メーカー： 日本曹達 原体メーカー： 日本曹達
成分： チオファネートメチル〔ベンズイミダゾール系 PRTR・1種〕…20.0%	性状： 赤色ペースト 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】

- りんごの腐らん病に抑制効果の高いトップジン M を有効成分とし、植物性オイルをベースとして製剤された塗布剤である。
- 浸透力が強いので、病患部を粗削りした後に塗布することにより、胴腐らんを治療することができる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】

- 使用直前によく攪拌し、原液をそのまま刷毛等で塗布する。
- りんごの腐らん病の治療に使用する場合、病斑をあらく削り取り、周辺健全部への薬剤の浸透性を高めた後、塗布する。
- 剪定痕や環状はく皮痕の切り口には使用をさける。
- 使用後の刷毛はそのまま放置せず、水でよく洗っておく。

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
りんご	腐らん病	原液	剪定時及び病患部削り取り直後	3回以内	塗布	10回以内 (塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内)
いちじく	株枯病		収穫後から休眠期			14回以内 (塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内)