

クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル粒剤 箱王子粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ、住友化学 原体メーカー： 住友化学、住友化学、 住友化学・バイエル
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………1.5% スピネトラム〔スピノシン系〕……………0.5% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
湛水直播 水稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ キリウジガガンボ	1kg/10a	は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 （は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内） スピネトラム 3回以内 （は種時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内） イソチアニル 3回以内 （は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内）
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ コブノメイガ イネツトムシ	育苗箱* 1箱当り 50g	は種前	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 （移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内） スピネトラム 3回以内 （移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内） イソチアニル 3回以内 （移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）
			は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。	
			移植3日前 ～移植当日		
	イネヒメハモグリバエ		は種前	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種時 (覆土前)	育苗箱の上から均一に散布する。	

* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ