

ダイムロン・ペントキサゾン水和剤 ダッシュワンフロアブル	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： エス・ディー・エス，科研製薬
成分： ダイムロン〔尿素系〕……………22.9% ペントキサゾン〔オキサゾリジンジオン系〕……………3.8%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 田植え前，田植え後のどちらにも使用が可能な初期除草剤。
- 植代時の使用で濁水処理が可能である。
- カヤツリグサ科雑草，アゼナ，コナギ，スルホニルウレア剤抵抗性のホタルイなどの幅広い草種に安定した効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 雑草の発生前から発生始期に有効なので，ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので，必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	発生前～発生始期まで
クログワイ	発生前

- 藻類又は表層はく離の発生しやすい水田では有効な剤との体系で使用する。
- クログワイ防除は，有効な後処理剤と組み合わせて使用する。また，クログワイについては有効な後処理剤と組み合わせて連年施用することにより効果が向上する。
- 移植前に散布する場合は，散布後7日以上の間隔をあけて稲を移植する。
- 自然減水により田面の一部が露出する間際になったら，水尻は止めたままにし，通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じる。

- 共通注意事項の5，水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（水稻）の薬害等の注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（くわい，れんこん，せりなど）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項の5，水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 藻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	植代時 (移植7日前まで)	500 ml	植代時に原液の まま散布し混和 する	1 回※
		移植時		田植同時散布機 で施用	
		植代後～移植前7日 又は移植直後～ ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布	

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内 (育苗箱散布は 1 回以内, 本田では 2 回以内)

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内